

การวิเคราะห์ข้อมูลตาย 13 สาเหตุ

1) ที่มาของข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลการตายที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทะเบียนการตายของสำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย และมีการให้รหัสสาเหตุการตาย โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ เป็นข้อมูลการตายของ ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2566 และจำนวนประชากรกลางปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นตัวหารในการคำนวณอัตราตาย ทั้งนี้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลการตายจำแนกตาม เขตสุขภาพ และ จังหวัด ยึดตามที่อยู่ของผู้ตาย (ตามทะเบียนบ้าน) โดยมีสูตรการคำนวณอัตราตายรายสาเหตุ ดังนี้

$$\text{อัตราตายรายสาเหตุ} = \text{จำนวนตายรายสาเหตุ} \times 100,000 / \text{จำนวนประชากรกลางปี}$$

ในการแสดงผลข้อมูล มีการแสดงผลข้อมูล ดังนี้

- 1) แนวโน้มรายปี เปรียบเทียบเพศ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2561-2566
- 2) เปรียบเทียบเพศ และกลุ่มอายุ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2566
- 3) เปรียบเทียบเขตสุขภาพ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2566
- 4) เปรียบเทียบจังหวัด (จำนวนตาย และอัตราตาย) เรียงลำดับตามอัตราตาย ปี 2566
- 5) แผนที่จังหวัด โไล่เฉดสีตาม อัตราตาย ปี 2566
- 6) แผนที่จังหวัด โไล่เฉดสีตาม อันดับหนึ่งของจังหวัด ตามอัตราตาย ปี 2566
- 7) เปรียบเทียบจังหวัด (จำนวนตาย และอัตราตาย) เรียงลำดับตามอัตราตาย ปี 2561-2566 (จำนวน=รวม, อัตรา=เฉลี่ย)
- 8) แผนที่จังหวัด โไล่เฉดสีตาม อัตราตาย ปี 2561-2566 (อัตรา=เฉลี่ย 6 ปี)
- 9) แผนที่จังหวัด โไล่เฉดสีตาม อันดับหนึ่งของจังหวัด ตามอัตราตาย ปี 2561-2566 (อัตรา=เฉลี่ย 6 ปี)

2) สาเหตุการตาย 13 สาเหตุ


สาเหตุการตาย 13 สาเหตุ ประกอบด้วยสาเหตุการตาย ดังนี้

- 1) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- 2) โรคตับ
- 3) โรคเบาหวาน
- 4) โรคหัวใจขาดเลือด
- 5) โรคหลอดเลือดสมอง
- 6) โรคไตวายเรื้อรัง
- 7) โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
- 8) โรคมะเร็งปอด
- 9) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- 10) โรคมะเร็งเต้านม
- 11) อุบัติเหตุจราจร
- 12) การจมน้ำ
- 13) การฆ่าตัวตาย


หมายเหตุ อัตราตาย ปี 2561-2566 (เฉลี่ย 6 ปี) =
ผลรวมของจำนวนตาย ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)
คูณ 100,000 หารด้วย
ผลรวมของจำนวนประชากรกลางปี ปี 2561-2566
(รวม 6 ปี)

3) รูปแบบการแสดงผลข้อมูล


การแสดงผลรูปแบบที่ 1 แนวโน้มรายปี เปรียบเทียบเพศ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2561-2566



การแสดงผลรูปแบบที่ 2 เปรียบเทียบเพศ และกลุ่มอายุ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2566




การแสดงผลรูปแบบที่ 3 เปรียบเทียบเขตสุขภาพ (จำนวนตาย และอัตราตาย) ปี 2566




เขตสุขภาพ ที่ 1-13

แผนที่ และรายชื่อจังหวัดในเขตสุขภาพ ที่ 1-13




เขตสุขภาพ	จังหวัด
เขต 1	เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน
เขต 2	พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
เขต 3	นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท
เขต 4	นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต 5	ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
เขต 6	สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว
เขต 7	ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์
เขต 8	อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร นครพนม
เขต 9	นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
เขต 10	อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร
เขต 11	นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต
เขต 12	สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
เขต 13	กรุงเทพมหานคร





← การแสดงผลรูปแบบที่ 4 เปรียบเทียบ
จังหวัด (จำนวนตาย และอัตราตาย)
เรียงลำดับตามอัตราตาย ปี 2566

การแสดงผลรูปแบบที่ 5 แผนที่จังหวัด
ไล่เฉดสีตาม อัตราตาย ปี 2566




การแสดงผลรูปแบบที่ 6 แผนที่
จังหวัดไล่เฉดสีตาม อันดับของ
จังหวัด ตามอัตราตาย ปี 2566






← การแสดงผลรูปแบบที่ 7 เปรียบเทียบ
จังหวัด (จำนวนตาย และอัตราตาย)
เรียงลำดับตามอัตราตาย ปี 2561-
2566 (จำนวน=รวม, อัตรา=เฉลี่ย)

การแสดงผลรูปแบบที่ 8 แผนที่จังหวัด
ไล่เฉดสีตาม อัตราตาย ปี 2561-2566
(อัตรา=เฉลี่ย 6 ปี)



การแสดงผลรูปแบบที่ 9 แผนที่
จังหวัดไล่เฉดสีตาม อันดับหนึ่งของ
จังหวัด ตามอัตราตาย ปี 2561-2566
(อัตรา=เฉลี่ย 6 ปี)




1) การตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง


1) แนวโน้มอัตราการตาย

อัตราการตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มที่ลดลงจาก 10.38 ต่อแสนประชากร ในปี 2562 เหลือ 8.95 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 7.81 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 แล้วเริ่มมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.1 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 และ 9.51 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 ตามลำดับ โดยเพศชายมีอัตราการตายที่สูงกว่าเพศหญิง เกือบ 5 เท่า (15.64 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 3.67 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 1.1 และ ภาพที่ 1.2)

ภาพที่ 1.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 1.2 แนวโน้มอัตราการตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราการตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 1.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่จะเป็นในเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยอัตราการตายในเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 80.78 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (16.39 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราการตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 1 (21.72 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2 (13.92 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 3 (13.35 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตายต่ำสุด (4.81 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 1.4)

ภาพที่ 1.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 1.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 1.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 1.6-1.7 โดยภาพที่ 1.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 1.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 1.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 1.9-1.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 1.5 อัตราตายและจำนวนตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 1.6 แผนที่อัตราตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปี 2566




ภาพที่ 1.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัดตามอัตราตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปี 2566






← **ภาพที่ 1.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 1.9 แผนที่อัตราตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปี 2561-2566



ภาพที่ 1.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคปอดอักเสบเรื้อรัง ปี 2561-2566




2) การตายจากโรคตับ


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากโรคตับ มีแนวโน้มขึ้นลงอยู่ในช่วง 15.27 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 ถึง 17.59 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 โดยในปี 2566 มีอัตราตายอยู่ที่ 16.72 ต่อแสนประชากร และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราตายในปี 2561 จะพบว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 1.45 ต่อแสนประชากร โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง ประมาณ 2.5 เท่า (24.35 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 9.45 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 2.1 และ ภาพที่ 2.2)

ภาพที่ 2.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคตับ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 2.2 แนวโน้มอัตราตายจากโรคตับ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากโรคตับ รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 2.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นในเพศชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 45-59 ปี มีอัตราตายสูงสุด อยู่ที่ 51.48 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป (45.89 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากโรคตับ ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 9 (25.62 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 7 (23.06 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 2 (23.04 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราตายต่ำสุด (7.52 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.3 จำนวนตายและอัตรามตายจากโรคตับ จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 2.4 จำนวนตายและอัตรามตายจากโรคตับ จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตรามตายรายจังหวัด

อัตรามตายจากโรคตับ รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 2.5 และแผนที่อัตรามตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 2.6-2.7 โดยภาพที่ 2.6 แสดงการกระจายตามอัตรามตาย และภาพที่ 2.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตรามตายจากโรคตับ รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 2.8 และแผนที่อัตรามตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 2.9-2.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตรามตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 2.5** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคตับ รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 2.6 แผนที่อัตราตายจากโรค
ตับ ปี 2566




ภาพที่ 2.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด
ตามอัตราตายจากโรคตับ ปี 2566






← **ภาพที่ 2.8** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคตับ รายจังหวัด
ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 2.9 แผนที่อัตราตายจากโรค
ตับ ปี 2561-2566



ภาพที่ 2.10 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจากโรคตับ
ปี 2561-2566




3) การตายจากโรคเบาหวาน


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากโรคเบาหวาน มีแนวโน้มที่ลดลงจาก 25.87 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 เหลือ 22.03 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 โดยแนวโน้มในช่วงระหว่างปี 2562-2565 ค่อนข้างคงที่ อยู่ที่ 24.05 ต่อแสนประชากร ถึง 25.87 ต่อแสนประชากร โดยเพศชาย มีอัตราตายที่ต่ำกว่าเพศหญิง ประมาณ 5 ต่อแสนประชากร (19.69 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 24.27 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 3.1 และ ภาพที่ 3.2)

ภาพที่ 3.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคเบาหวาน เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 3.2 แนวโน้มอัตราตายจากโรคเบาหวาน เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากโรคเบาหวาน รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 3.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ อยู่ใน ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (96.17 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศชาย อายุ 60 ปี ขึ้นไป (79.33 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากโรคเบาหวาน ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 7 (41.79 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 8 (33.84 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 10 (25.70 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตาย ต่ำสุด (9.73 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 3.4)

ภาพที่ 3.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคเบาหวาน จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 3.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคเบาหวาน จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตรายตายรายจังหวัด

อัตรายตายจากโรคเบาหวาน รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง [ภาพที่ 3.5](#) และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง [ภาพที่ 3.6-3.7](#) โดยภาพที่ 3.6 แสดงการกระจายตามอัตรายตาย และภาพที่ 3.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตรายตายจากโรคเบาหวาน รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง [ภาพที่ 3.8](#) และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง [ภาพที่ 3.9-3.10](#) (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตรายตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 3.5** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคเบาหวาน รายจังหวัด
ปี 2566

ภาพที่ 3.6 แผนที่อัตราตายจาก
โรคเบาหวาน ปี 2566




ภาพที่ 3.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด
ตามอัตราตายจากโรคเบาหวาน
ปี 2566






← **ภาพที่ 3.8** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคเบาหวาน รายจังหวัด
ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 3.9 แผนที่อัตราตายจาก
โรคเบาหวาน ปี 2561-2566



ภาพที่ 3.10 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจาก
โรคเบาหวาน ปี 2561-2566




4) การตายจากโรคหัวใจขาดเลือด


1) แนวโน้มอัตราการตาย

อัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2561 ถึงปี 2565 โดยเพิ่มจาก 31.78 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 35.07 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 และในปี 2566 มีอัตราการตายที่ลดลง เป็น 33.53 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 โดยเพศชายมีอัตราการตายที่สูงกว่าเพศหญิง เกือบ 2 เท่า (43.44 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 24.1 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 4.1 และ ภาพที่ 4.2)

ภาพที่ 4.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคหัวใจขาดเลือด เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 4.2 แนวโน้มอัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 4.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่จะเป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการตายสูงสุด (155.1 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (94.83 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราการตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 3 (43.72 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4 (42.22 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 2 (41.14 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 8 มีอัตราการตายต่ำสุด (23.98 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 4.4)

ภาพที่ 4.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคหัวใจขาดเลือด จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 4.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคหัวใจขาดเลือด จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 4.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 4.6-4.7 โดยภาพที่ 4.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 4.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 4.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 4.9-4.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 4.5 อัตราตายและจำนวนตายจากโรคหัวใจขาดเลือด รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 4.6 แผนที่อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2566




ภาพที่ 4.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัดตามอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2566






← **ภาพที่ 4.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคหัวใจขาดเลือด รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 4.9 แผนที่อัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2561-2566



ภาพที่ 4.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคหัวใจขาดเลือด ปี 2561-2566




5) การตายจากโรคหลอดเลือดสมอง


1) แนวโน้มอัตราการตาย

อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 47.15 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 55.53 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 และ 58.3 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 ตามลำดับ หรือมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น 11.15 ต่อแสนประชากร ในช่วงเวลา 6 ปี โดยเพศชายมีอัตราการตายที่สูงกว่าเพศหญิง (69.71 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 47.45 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 5.1 และ ภาพที่ 5.2)

ภาพที่ 5.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 5.2 แนวโน้มอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 5.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่จะเป็นประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการตายสูงสุด (247.09 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (177.14 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 3 (78.75 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2 (71.26 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 9 (65.79 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราการตายต่ำสุด (47.18 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 5.4)

ภาพที่ 5.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคหลอดเลือดสมอง จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 5.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคหลอดเลือดสมอง จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 5.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 5.6-5.7 โดยภาพที่ 5.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 5.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 5.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 5.9-5.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 5.5 อัตราตายและจำนวนตายจากโรคหลอดเลือดสมอง รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 5.6 แผนที่อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2566




ภาพที่ 5.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัดตามอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2566






← **ภาพที่ 5.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคหลอดเลือดสมอง รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 5.9 แผนที่อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561-2566



ภาพที่ 5.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2561-2566




6) การตายจากโรคไตวายเรื้อรัง


1) แนวโน้มอัตราการตาย

อัตราการตายจากโรคไตวายเรื้อรัง มีแนวโน้มขึ้นลงอยู่ในช่วง 15.2 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 ถึง 18.86 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 โดยในปี 2566 มีอัตราการตายอยู่ที่ 17.21 ต่อแสนประชากร และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการตายในปี 2561 จะพบว่าแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 2 ต่อแสนประชากร โดยเพศหญิงมีอัตราการตายที่สูงกว่าเพศชายเล็กน้อย (17.7 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 16.69 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 6.1 และ ภาพที่ 6.2)

ภาพที่ 6.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคไตวายเรื้อรัง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 6.2 แนวโน้มอัตราการตายจากโรคไตวายเรื้อรัง เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราการตายจากโรคไตวายเรื้อรัง รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 6.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการตาย 70.29 ต่อแสนประชากร ซึ่งใกล้เคียงกับเพศหญิง อายุ 60 ปี ขึ้นไป (69.04 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราการตายจากโรคไตวายเรื้อรัง ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 7 (26.74 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 1 (26.68 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 10 (23.88 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราการตายต่ำสุด (9.06 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 6.4)

ภาพที่ 6.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคไตวายเรื้อรัง จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 6.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคไตวายเรื้อรัง จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากโรคไตวายเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 6.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 6.6-6.7 โดยภาพที่ 6.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 6.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับ อัตราตายจากโรคไตวายเรื้อรัง รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 6.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 6.9-6.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 6.5 อัตราตายและจำนวนตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 6.6 แผนที่อัตราตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2566




ภาพที่ 6.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัดตามอัตราตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2566






← **ภาพที่ 6.8** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคไตวายเรื้อรัง รายจังหวัด
ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 6.9 แผนที่อัตราตายจาก
โรคไตวายเรื้อรัง ปี 2561-2566



ภาพที่ 6.10 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจากโรคไตวาย
เรื้อรัง ปี 2561-2566




7) การตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ในช่วงปี 2561-2563 โดยมีอัตราตายอยู่ในช่วง 24.33 ถึง 24.85 ต่อแสนประชากร แล้วเริ่มลดลงอย่างช้าๆ จาก 24.66 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 เหลือ 23 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง เกือบ 3 เท่า (33.93 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 12.6 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 7.1 และ ภาพที่ 7.2)

ภาพที่ 7.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 7.2 แนวโน้มอัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 7.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นประชากร อายุ 45 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (117.2 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศชาย อายุ 45-59 ปี (49.36 ต่อแสนประชากร) และเพศหญิงอายุ 60 ปีขึ้นไป (45.13 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 8 (35.68 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 7 (35.5 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 2 (31.54 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราตายต่ำสุด (9.16 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 7.4)

ภาพที่ 7.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 7.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตรายตายรายจังหวัด

อัตรายตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 7.5 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 7.6-7.7 โดยภาพที่ 7.6 แสดงการกระจายตามอัตรายตาย และภาพที่ 7.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตรายตายจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 7.8 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 7.9-7.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตรายตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 7.5** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคมาเร็งตับและท่อน้ำดี ราย
จังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 7.6 แผนที่อัตราตายจาก
โรคมาเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566




ภาพที่ 7.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด
ตามอัตราตายจากโรคมาเร็งตับและ
ท่อน้ำดี ปี 2566






← **ภาพที่ 7.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคมาเร็งดับและท่อน้ำตี รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 7.9 แผนที่อัตราตายจากโรคมาเร็งดับและท่อน้ำตี ปี 2561-2566



ภาพที่ 7.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคมาเร็งดับและท่อน้ำตี ปี 2561-2566




8) การตายจากโรคมะเร็งปอด


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 21.34 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 22.61 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 23.04 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 ตามลำดับ หรือมีอัตราตายเพิ่มขึ้น 1.7 ต่อแสนประชากร ในช่วงเวลา 6 ปี โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง ประมาณ 2 เท่า (29.73 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 16.68 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 8.1 และ ภาพที่ 8.2)

ภาพที่ 8.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคมะเร็งปอด เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 8.2 แนวโน้มอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 8.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (128.3 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (57.13 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 1 (35.58 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2 (26.45 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 3 (26.08 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราตายต่ำสุด (16.02 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 8.4)

ภาพที่ 8.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งปอด จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 8.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งปอด จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตรายตายรายจังหวัด

อัตรายตายจากโรคมะเร็งปอด รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 8.5 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 8.6-8.7 โดยภาพที่ 8.6 แสดงการกระจายตามอัตรายตาย และภาพที่ 8.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับ อัตรายตายจากโรคมะเร็งปอด รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 8.8 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 8.9-8.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตรายตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 8.5** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคมะเร็งปอด รายจังหวัด
ปี 2566

ภาพที่ 8.6 แผนที่อัตราตายจาก
โรคมะเร็งปอด ปี 2566




ภาพที่ 8.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด
ตามอัตราตายจากโรคมะเร็งปอด
ปี 2566






← **ภาพที่ 8.8** อัตราตายและจำนวนตาย
จากโรคมะเร็งปอด รายจังหวัด
ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 8.9 แผนที่อัตราตายจาก
โรคมะเร็งปอด ปี 2561-2566



ภาพที่ 8.10 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจากโรคมะเร็ง
ปอด ปี 2561-2566




9) การตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก 7.75 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 8.35 ต่อแสนประชากร ในปี 2562 แล้วลดลงเหลือ 8.22 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 7.74 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 ตามลำดับ และในปี 2565-2566 กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (8.18 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 และ 8.86 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง (10.4 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 7.39 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 9.1 และ ภาพที่ 9.2)

ภาพที่ 9.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 9.2 แนวโน้มอัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 9.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่จะเป็นประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (42.58 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป (24.63 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) (14.06 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4 (12.42 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 3 (12.1 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 12 มีอัตราตายต่ำสุด (4.94 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 9.4)

ภาพที่ 9.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 9.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตรายตายรายจังหวัด

อัตรายตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 9.5 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 9.6-9.7 โดยภาพที่ 9.6 แสดงการกระจายตามอัตรายตาย และภาพที่ 9.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตรายตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 9.8 และแผนที่อัตรายตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 9.9-9.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตรายตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 9.5 อัตราตายและจำนวนตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 9.6 แผนที่อัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2566




ภาพที่ 9.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัดตามอัตราตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2566






← **ภาพที่ 9.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 9.9 แผนที่อัตราตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2561-2566



ภาพที่ 9.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคโควิด-19 รายจังหวัด ปี 2561-2566




10) การตายจากโรคมะเร็งเต้านม


1) แนวโน้มอัตราการตาย

อัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านม มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก 6.83 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 7.37 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 7.6 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 ตามลำดับ โดยเพศหญิงมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจาก 13.31 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 14.34 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 14.75 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ หรือมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น 1.44 ต่อแสนประชากร ในช่วงเวลา 6 ปี (ภาพที่ 10.1 และ ภาพที่ 10.2)

ภาพที่ 10.1 แนวโน้มจำนวนตายจากโรคมะเร็งเต้านม เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 10.2 แนวโน้มอัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านม เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านม รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 10.3 โดยการตายส่วนใหญ่ จะเป็นในเพศหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป โดยในเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการตายสูงสุด (32.26 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศหญิง อายุ 45-59 ปี (25.25 ต่อแสนประชากร)


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราการตายจากโรคมะเร็งเต้านม ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) (10.33 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ เขตสุขภาพที่ 3 (9.17 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 4 (8.78 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 10 มีอัตรา ตายต่ำสุด (5.65 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 10.4)

ภาพที่ 10.3 จำนวนตายและอัตรตายจากโรคมะเร็งเต้านม จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 10.4 จำนวนตายและอัตรตายจากโรคมะเร็งเต้านม จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง [ภาพที่ 10.5](#) และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง [ภาพที่ 10.6-10.7](#) โดยภาพที่ 10.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 10.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง [ภาพที่ 10.8](#) และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง [ภาพที่ 10.9-10.10](#) (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 10.5** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคมะเร็งเต้านม รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 10.6 แผนที่อัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม ปี 2566




ภาพที่ 10.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม ปี 2566






← **ภาพที่ 10.8** อัตราตายและจำนวนตายจากโรคมาเลเรียตาม รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 10.9 แผนที่อัตราตายจากโรคมาเลเรียตาม รายจังหวัด ปี 2561-2566



ภาพที่ 10.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากโรคมาเลเรียตาม รายจังหวัด ปี 2561-2566




11) การตายจากอุบัติเหตุจราจร


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร มีแนวโน้มที่ลดลงจาก 30.25 ต่อแสนประชากร ในปี 2562 เหลือ 26.28 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 และ 25.46 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 แล้วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 26.4 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 และ 25.96 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 ตามลำดับ โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง เกือบ 4 เท่า (41.07 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 11.58 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 11.1 และ ภาพที่ 11.2)

ภาพที่ 11.1 แนวโน้มจำนวนตายจากอุบัติเหตุจราจร เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 11.2 แนวโน้มอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 11.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นเพศชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (54.87 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศชาย อายุ 15-29 ปี (52.89 ต่อแสนประชากร) และเพศชาย อายุ 30-44 ปี (42.33 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 3 (33.86 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 1 (30.84 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 5 (30.44 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตายต่ำสุด (11.83 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 11.4)

ภาพที่ 11.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากอุบัติเหตุจราจร จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 11.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากอุบัติเหตุจราจร จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง **ภาพที่ 11.5** และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง **ภาพที่ 11.6-11.7** โดยภาพที่ 11.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 11.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง **ภาพที่ 11.8** และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง **ภาพที่ 11.9-11.10** (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 11.5** อัตราตายและจำนวน
ตายจากอุบัติเหตุจราจร รายจังหวัด
ปี 2566

ภาพที่ 11.6 แผนที่อัตราตายจาก
อุบัติเหตุจราจร ปี 2566




ภาพที่ 11.7 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจากอุบัติเหตุ
จราจร ปี 2566






← **ภาพที่ 11.8** อัตราตายและจำนวนตายจากอุบัติเหตุจราจร รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 11.9 แผนที่อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2561-2566



ภาพที่ 11.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2561-2566




12) การตายจากการจมน้ำ


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากการจมน้ำ มีแนวโน้มที่ลดลงจาก 5.47 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เหลือ 5.04 ต่อแสนประชากร ในปี 2562 และ 4.81 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 แล้วมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็น 6.07 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 และ 6.88 ต่อแสนประชากร ในปี 2565 ตามลำดับ แล้วลดลงเหลือ 5.95 ต่อแสนประชากร ในปี 2566 โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง 5 เท่า (10.04 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 2.06 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 12.1 และ ภาพที่ 12.2)

ภาพที่ 12.1 แนวโน้มจำนวนตายจากการจมน้ำ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 12.2 แนวโน้มอัตราตายจากการจมน้ำ เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากการจมน้ำ รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 12.3 ทั้งนี้การตายจากการจมน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มอายุ โดยเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราตายสูงสุด (15.01 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศชาย อายุ 45-59 ปี (14.22 ต่อแสนประชากร) และเพศชาย อายุ 5-14 ปี (8.82 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากการจมน้ำ ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 7 (9.11 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 9 (9.01 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 10 (8.46 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตายต่ำสุด (2.3 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 12.4)

ภาพที่ 12.3 จำนวนตายและอัตรายตายจากการจมน้ำ จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 12.4 จำนวนตายและอัตรายตายจากการจมน้ำ จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากการจมน้ำ รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 12.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 12.6-12.7 โดยภาพที่ 12.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 12.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากการจมน้ำ รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 12.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 12.9-12.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





← **ภาพที่ 12.5** อัตราตายและจำนวน
ตายจากการจมน้ำ รายจังหวัด
ปี 2566

ภาพที่ 12.6 แผนที่อัตราตายจากการ
จมน้ำ ปี 2566




ภาพที่ 12.7 แผนที่อันดับที่ของ
จังหวัด ตามอัตราตายจากการจมน้ำ
ปี 2566






← **ภาพที่ 12.8** อัตราตายและจำนวนตายจากการจมน้ำ รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 12.9 แผนที่อัตราตายจากการจมน้ำ ปี 2561-2566



ภาพที่ 12.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากการจมน้ำ ปี 2561-2566




13) การตายจากการฆ่าตัวตาย


1) แนวโน้มอัตราตาย

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจาก 7.27 ต่อแสนประชากร ในปี 2561 เป็น 8.95 ต่อแสนประชากร ในปี 2562 และ 10.31 ต่อแสนประชากร ในปี 2563 ตามลำดับ แล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระหว่างปี 2564-2566 (เพิ่มจาก 9.75 ต่อแสนประชากร ในปี 2564 เป็น 10.63 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) โดยเพศชายมีอัตราตายที่สูงกว่าเพศหญิง ประมาณ 4 เท่า (17.42 ต่อแสนประชากร เทียบกับ 4.18 ต่อแสนประชากร ในปี 2566) (ภาพที่ 13.1 และ ภาพที่ 13.2)

ภาพที่ 13.1 แนวโน้มจำนวนตายจากการฆ่าตัวตาย เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566



ภาพที่ 13.2 แนวโน้มอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย เพศชาย เพศหญิง และ รวมเพศชายและหญิง ปี 2561-2566




2) อัตราตายรายเพศและกลุ่มอายุ

จำนวนตายและอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายเพศและกลุ่มอายุ ปี 2566 แสดงใน ภาพที่ 13.3 ทั้งนี้การตายส่วนใหญ่ จะเป็นในเพศชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเพศชาย อายุ 30-44 ปี มีอัตราตายสูงสุด (24.12 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเพศชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป (23.27 ต่อแสนประชากร) และเพศชาย อายุ 45-59 ปี (21.89 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ


3) อัตราตายรายเขตสุขภาพ

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2566 สูงสุดที่ เขตสุขภาพที่ 1 (19.25 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2 (13.62 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 11 (12.51 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ โดยเขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตายต่ำสุด (3.47 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 13.4)

ภาพที่ 13.3 จำนวนตายและอัตรายจากการฆ่าตัวตาย จำแนกเพศ และกลุ่มอายุ ปี 2566




ภาพที่ 13.4 จำนวนตายและอัตรายจากการฆ่าตัวตาย จำแนกเขตสุขภาพ ปี 2566




4) อัตราตายรายจังหวัด

อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 13.5 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2566 แสดงดัง ภาพที่ 13.6-13.7 โดยภาพที่ 13.6 แสดงการกระจายตามอัตราตาย และภาพที่ 13.7 แสดงการกระจายตามอันดับที่ของจังหวัด และสำหรับอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี) แสดงดัง ภาพที่ 13.8 และแผนที่อัตราตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 แสดงดัง ภาพที่ 13.9-13.10 (จำนวนตาย 6 ปี เป็นผลรวม 6 ปี และอัตราตาย 6 ปี เป็นค่าเฉลี่ย 6 ปี)





ภาพที่ 13.5 อัตราตายและจำนวนตายจากการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี 2566

ภาพที่ 13.6 แผนที่อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2566




ภาพที่ 13.7 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2566






← **ภาพที่ 13.8** อัตราตายและจำนวนตายจากการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

ภาพที่ 13.9 แผนที่อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2561-2566



ภาพที่ 13.10 แผนที่อันดับที่ของจังหวัด ตามอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ปี 2561-2566



สรุปอัตราการตายและอันดับที่ของจังหวัด 13 สาเหตุ

ตารางที่ 1.1 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ และโรคเบาหวาน ปี 2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		โรคตับ		โรคเบาหวาน	
		อัตราการตาย	อันดับที่	อัตราการตาย	อันดับที่	อัตราการตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	16.11	9	16.84	35	20.27	40
เชียงราย	1	19.81	7	14.41	48	14.92	58
แพร่	1	22.21	5	26.88	4	29.22	20
แม่ฮ่องสอน	1	9.08	36	11.56	56	6.19	77
น่าน	1	33.49	1	15.68	43	8.05	74
พะเยา	1	28.86	3	33.02	1	16.84	53
ลำปาง	1	30.61	2	21.62	20	16.43	54
ลำพูน	1	19.45	8	16.92	34	14.15	63
เพชรบูรณ์	2	14.87	16	26.02	6	24.99	26
ตาก	2	16.07	10	17.16	31	12.23	65
พิษณุโลก	2	13.19	22	25.20	10	27.93	21
สุโขทัย	2	14.51	18	21.42	22	21.42	35
อุตรดิตถ์	2	9.77	32	21.81	19	8.41	73
กำแพงเพชร	3	11.77	26	21.55	21	25.52	24
ชัยนาท	3	19.88	6	24.61	12	31.24	14
นครสวรรค์	3	15.44	12	24.04	14	17.39	49
พิจิตร	3	8.22	42	14.71	46	9.94	69
อุทัยธานี	3	12.09	25	15.81	42	23.56	31
นครนายก	4	15.84	11	20.09	25	23.18	32
นนทบุรี	4	3.95	74	8.52	70	6.89	75
ปทุมธานี	4	6.33	57	9.67	63	9.83	70
พระนครศรีอยุธยา	4	8.55	41	13.67	49	16.85	52
ลพบุรี	4	8.89	38	16.55	38	20.38	39
สระบุรี	4	10.37	28	17.91	28	17.44	48
สิงห์บุรี	4	6.94	52	15.86	41	14.37	62
อ่างทอง	4	4.79	70	10.69	58	26.18	23
เพชรบุรี	5	8.14	44	8.98	69	14.61	61
กาญจนบุรี	5	12.73	24	16.04	40	17.27	50
นครปฐม	5	7.24	49	12.40	54	16.24	55
ประจวบคีรีขันธ์	5	7.23	50	9.09	68	10.76	68
ราชบุรี	5	7.28	48	17.53	30	21.71	34
สมุทรสงคราม	5	6.95	51	10.69	57	21.39	36
สมุทรสาคร	5	4.11	73	9.47	66	15.54	57
สุพรรณบุรี	5	10.90	27	14.41	47	32.81	12
จันทบุรี	6	23.68	4	25.94	7	37.03	6
ฉะเชิงเทรา	6	15.32	13	16.70	36	24.43	28
ชลบุรี	6	5.87	59	13.01	52	17.11	51
ตราด	6	15.15	14	20.20	24	17.91	46
ปราจีนบุรี	6	5.63	62	19.30	26	6.43	76
ระยอง	6	6.34	56	17.03	33	17.95	45
สมุทรปราการ	6	5.93	58	13.35	51	20.02	41
สระแก้ว	6	13.98	19	31.36	2	24.19	29

ตารางที่ 1.1 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ และโรคเบาหวาน ปี 2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		โรคตับ		โรคเบาหวาน	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	8.87	39	24.87	11	44.47	3
ขอนแก่น	7	5.68	61	21.14	23	24.58	27
มหาสารคาม	7	7.55	46	22.97	16	55.93	1
ร้อยเอ็ด	7	8.70	40	24.40	13	53.24	2
เลย	8	9.81	31	15.50	44	27.21	22
นครพนม	8	4.34	71	17.09	32	36.57	7
บึงกาฬ	8	4.28	72	15.47	45	36.17	8
สกลนคร	8	3.50	76	16.54	39	35.09	9
หนองคาย	8	4.90	68	17.84	29	29.80	16
หนองบัวลำภู	8	6.51	53	16.57	37	23.87	30
อุดรธานี	8	8.18	43	22.47	18	38.31	5
ชัยภูมิ	9	5.56	64	26.29	5	29.34	18
นครราชสีมา	9	9.04	37	22.49	17	15.94	56
บุรีรัมย์	9	9.86	29	30.71	3	34.46	10
สุรินทร์	9	3.58	75	25.21	9	17.46	47
มุกดาหาร	10	9.76	33	9.76	61	19.52	42
ยโสธร	10	9.25	34	23.40	15	41.71	4
ศรีสะเกษ	10	6.41	54	25.64	8	14.06	64
อำนาจเจริญ	10	5.62	63	19.25	27	29.68	17
อุบลราชธานี	10	5.86	60	13.54	50	30.58	15
กระบี่	11	9.82	30	6.47	73	10.86	67
ชุมพร	11	8.12	45	8.12	72	14.85	59
นครศรีธรรมราช	11	13.83	20	9.55	64	18.18	44
พังงา	11	9.11	35	9.49	65	12.15	66
ภูเก็ต	11	5.12	67	8.29	71	9.75	71
ระนอง	11	12.80	23	12.80	53	21.15	37
สุราษฎร์ธานี	11	13.42	21	10.32	60	14.73	60
ตรัง	12	15.09	15	10.69	59	32.53	13
นราธิวาส	12	5.52	65	4.17	77	25.26	25
ปัตตานี	12	14.86	17	5.45	74	33.27	11
พัทลุง	12	6.34	55	12.29	55	18.82	43
ยะลา	12	3.11	77	4.39	76	22.70	33
สงขลา	12	7.31	47	9.21	67	20.74	38
สตูล	12	5.23	66	4.62	75	29.24	19
กรุงเทพมหานคร	13	4.81	69	9.68	62	9.73	72

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77

(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.2 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง ปี 2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคหัวใจขาดเลือด		โรคหลอดเลือดสมอง		โรคไตวายเรื้อรัง	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	30.44	46	56.40	45	18.74	30
เชียงราย	1	21.35	73	51.63	53	20.07	22
แพร่	1	42.07	15	77.13	8	31.79	7
แม่ฮ่องสอน	1	16.92	77	41.68	72	9.49	69
น่าน	1	29.04	52	70.15	19	45.78	1
พะเยา	1	48.11	9	70.63	18	40.45	4
ลำปาง	1	47.73	10	90.41	2	41.70	3
ลำพูน	1	49.76	8	55.57	46	18.19	32
เพชรบูรณ์	2	30.36	47	73.94	12	20.03	23
ตาก	2	21.36	72	42.55	70	14.61	43
พิษณุโลก	2	42.55	14	85.10	4	21.87	18
สุโขทัย	2	36.96	31	74.27	10	22.11	17
อุตรดิตถ์	2	92.24	1	70.66	17	25.67	13
กำแพงเพชร	3	31.62	41	67.35	20	19.99	24
ชัยนาท	3	76.05	2	113.60	1	21.46	19
นครสวรรค์	3	45.83	11	89.90	3	25.99	11
พิจิตร	3	41.09	19	54.08	49	15.86	37
อุทัยธานี	3	35.96	34	74.09	11	11.16	60
นครนายก	4	51.38	6	77.65	6	15.45	39
นนทบุรี	4	35.76	36	45.67	63	10.53	63
ปทุมธานี	4	37.59	29	44.09	68	11.42	57
พระนครศรีอยุธยา	4	54.70	4	61.41	32	11.23	59
ลพบุรี	4	37.62	28	64.97	26	15.59	38
สระบุรี	4	43.04	13	77.45	7	10.84	62
สิงห์บุรี	4	39.14	25	70.86	16	9.91	66
อ่างทอง	4	59.73	3	73.00	13	14.01	46
เพชรบุรี	5	30.69	44	45.31	65	8.98	70
กาญจนบุรี	5	36.37	33	56.70	43	14.45	44
นครปฐม	5	36.75	32	60.00	35	9.54	67
ประจวบคีรีขันธ์	5	27.26	57	42.10	71	12.05	53
ราชบุรี	5	40.67	21	64.52	27	13.72	47
สมุทรสงคราม	5	44.91	12	59.35	37	12.30	52
สมุทรสาคร	5	32.33	39	44.29	67	7.32	74
สุพรรณบุรี	5	41.77	17	82.21	5	19.49	27
จันทบุรี	6	31.95	40	71.43	15	16.35	36
ฉะเชิงเทรา	6	36.99	30	50.10	57	15.18	40
ชลบุรี	6	27.09	60	43.63	69	11.75	56
ตราด	6	38.57	26	56.48	44	16.53	35
ปราจีนบุรี	6	24.93	64	61.31	33	18.90	29
ระยอง	6	28.91	53	48.05	60	13.20	49
สมุทรปราการ	6	40.56	22	58.20	39	10.31	64
สระแก้ว	6	21.68	70	63.61	30	20.61	21

ตารางที่ 1.2 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง ปี 2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคหัวใจขาดเลือด		โรคหลอดเลือดสมอง		โรคไตวายเรื้อรัง	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	28.48	54	60.47	34	37.46	5
ขอนแก่น	7	30.65	45	59.84	36	21.37	20
มหาสารคาม	7	27.22	58	65.93	23	24.78	14
ร้อยเอ็ด	7	22.69	69	65.59	24	27.51	9
เลย	8	27.84	56	65.49	25	34.48	6
นครพนม	8	29.42	49	47.22	61	26.06	10
บึงกาฬ	8	28.08	55	50.92	55	17.37	33
สกลนคร	8	17.41	76	45.33	64	18.29	31
หนองคาย	8	23.33	65	54.90	47	12.74	50
หนองบัวลำภู	8	26.24	62	54.25	48	31.17	8
อุดรธานี	8	23.12	66	58.66	38	19.90	25
ชัยภูมิ	9	29.25	50	66.05	22	17.32	34
นครราชสีมา	9	27.15	59	63.71	29	14.98	42
บุรีรัมย์	9	33.13	38	76.36	9	19.77	26
สุรินทร์	9	21.63	71	57.42	42	12.42	51
มุกดาหาร	10	20.66	74	52.81	51	44.77	2
ยโสธร	10	40.95	20	63.98	28	25.86	12
ศรีสะเกษ	10	17.99	75	49.48	58	18.95	28
อำนาจเจริญ	10	22.73	68	57.49	41	24.60	15
อุบลราชธานี	10	27.09	61	51.33	54	23.11	16
กระบี่	11	31.12	43	39.05	74	11.90	55
ชุมพร	11	35.83	35	53.65	50	6.73	75
นครศรีธรรมราช	11	49.93	7	57.66	40	13.51	48
พังงา	11	40.25	23	50.50	56	11.01	61
ภูเก็ต	11	22.92	67	32.92	76	14.14	45
ระนอง	11	31.17	42	40.08	73	8.91	71
สุราษฎร์ธานี	11	30.12	48	49.36	59	10.04	65
ตรัง	12	41.81	16	72.61	14	8.49	73
นราธิวาส	12	29.06	51	35.93	75	4.29	77
ปัตตานี	12	53.17	5	66.40	21	15.00	41
พัทลุง	12	41.09	18	63.37	31	8.83	72
ยะลา	12	25.99	63	32.03	77	6.22	76
สงขลา	12	37.90	27	52.74	52	9.49	68
สตูล	12	39.40	24	44.33	66	12.01	54
กรุงเทพมหานคร	13	35.59	37	47.18	62	11.24	58

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77

(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.3 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม ปี 2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	มะเร็งตับและท่อน้ำดี		มะเร็งปอด		มะเร็งลำไส้ใหญ่		มะเร็งเต้านม	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	26.64	24	33.80	4	7.53	44	6.80	49
เชียงราย	1	28.47	21	33.36	5	10.12	24	6.95	46
แพร่	1	42.54	3	35.76	3	12.62	10	8.41	19
แม่ฮ่องสอน	1	11.56	72	24.35	26	3.71	71	6.19	61
น่าน	1	26.28	26	33.27	6	8.90	33	6.57	53
พะเยา	1	40.67	6	41.11	2	10.28	22	8.97	15
ลำปาง	1	32.85	13	46.33	1	15.86	3	10.39	6
ลำพูน	1	24.00	37	33.09	7	8.59	36	6.31	58
เพชรบูรณ์	2	48.84	1	24.68	25	7.13	45	8.26	23
ตาก	2	20.27	44	29.03	11	5.84	59	2.92	77
พิษณุโลก	2	22.94	40	22.35	37	10.22	23	10.22	9
สุโขทัย	2	25.56	31	29.71	9	9.50	28	6.04	62
อุตรดิตถ์	2	31.81	15	30.67	8	8.86	34	7.95	29
กำแพงเพชร	3	26.94	23	23.96	30	10.78	17	8.08	25
ชัยนาท	3	28.08	22	27.45	16	15.15	5	11.68	2
นครสวรรค์	3	25.70	29	28.34	13	15.05	6	10.26	8
พิจิตร	3	20.83	43	22.74	35	7.64	41	7.45	39
อุทัยธานี	3	16.74	54	27.59	15	9.92	26	8.37	20
นครนายก	4	25.11	33	27.43	17	15.84	4	8.50	17
นนทบุรี	4	16.49	55	23.84	31	17.03	2	10.92	3
ปทุมธานี	4	14.75	62	20.00	59	10.67	18	9.50	11
พระนครศรีอยุธยา	4	18.19	50	20.02	58	9.28	31	7.33	42
ลพบุรี	4	23.12	39	20.52	57	8.34	37	7.93	30
สระบุรี	4	25.76	28	24.19	28	13.04	9	7.38	40
สิงห์บุรี	4	24.77	35	28.74	12	17.34	1	9.91	10
อ่างทอง	4	15.85	58	21.02	53	10.32	21	4.79	74
เพชรบุรี	5	17.75	51	21.09	52	5.43	63	10.65	5
กาญจนบุรี	5	14.69	63	20.57	56	12.37	13	7.10	45
นครปฐม	5	17.66	52	21.50	47	10.64	19	9.32	12
ประจวบคีรีขันธ์	5	16.32	56	18.92	65	9.64	27	7.79	32
ราชบุรี	5	19.56	47	24.21	27	12.40	12	7.51	37
สมุทรสงคราม	5	25.66	30	28.34	14	11.23	16	14.97	1
สมุทรสาคร	5	13.57	68	23.40	32	9.29	30	6.25	59
สุพรรณบุรี	5	19.61	46	26.52	21	11.50	15	9.20	13
จันทบุรี	6	25.19	32	26.88	19	8.27	38	10.90	4
ฉะเชิงเทรา	6	17.11	53	24.70	24	12.42	11	8.42	18
ชลบุรี	6	15.34	60	19.32	63	8.90	32	8.71	16
ตราด	6	23.42	38	22.04	42	10.10	25	7.81	31
ปราจีนบุรี	6	26.33	25	21.11	51	9.45	29	7.64	36
ระยอง	6	13.86	66	19.67	62	6.73	50	7.79	33
สมุทรปราการ	6	18.61	49	22.76	33	14.09	7	8.30	22
สระแก้ว	6	33.33	12	21.68	45	11.65	14	5.73	65

ตารางที่ 1.3 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม ปี 2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	มะเร็งตับและท่อน้ำดี		มะเร็งปอด		มะเร็งลำไส้ใหญ่		มะเร็งเต้านม	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	47.05	2	22.08	41	7.12	46	6.81	48
ขอนแก่น	7	30.20	18	20.69	55	6.69	51	8.04	26
มหาสารคาม	7	32.22	14	21.27	48	6.59	52	7.97	28
ร้อยเอ็ด	7	36.53	8	24.17	29	6.30	55	5.75	64
เลย	8	34.33	10	26.73	20	7.59	42	7.28	43
นครพนม	8	41.33	5	19.90	60	6.44	54	7.71	35
บึงกาฬ	8	24.99	34	19.27	64	4.28	70	5.47	67
สกลนคร	8	41.65	4	21.96	43	5.25	67	6.21	60
หนองคาย	8	31.37	16	26.47	22	3.14	74	6.67	51
หนองบัวลำภู	8	36.10	9	29.20	10	5.72	61	5.92	63
อุดรธานี	8	33.42	11	22.28	39	4.96	68	6.37	56
ชัยภูมิ	9	29.25	19	20.91	54	7.54	43	7.36	41
นครราชสีมา	9	22.72	41	22.76	34	10.37	20	8.16	24
บุรีรัมย์	9	21.74	42	18.37	67	8.71	35	6.49	55
สุรินทร์	9	19.65	45	16.95	70	5.33	65	4.82	73
มุกดาหาร	10	28.99	20	17.22	69	6.03	58	6.60	52
ยโสธร	10	40.20	7	21.14	49	6.98	48	7.74	34
ศรีสะเกษ	10	25.84	27	19.85	61	5.38	64	5.10	71
อำนาจเจริญ	10	31.02	17	15.78	73	3.21	73	5.35	70
อุบลราชธานี	10	24.24	36	18.17	68	5.75	60	5.37	68
กระบี่	11	8.77	74	13.99	74	3.34	72	4.39	75
ชุมพร	11	12.87	69	22.57	36	6.93	49	6.73	50
นครศรีธรรมราช	11	14.55	64	21.82	44	6.49	53	7.21	44
พังงา	11	18.98	48	21.64	46	5.32	66	9.11	14
ภูเก็ต	11	11.95	70	16.34	71	8.05	40	6.83	47
ระนอง	11	15.59	59	22.27	40	5.57	62	5.01	72
สุราษฎร์ธานี	11	11.92	71	21.11	50	6.19	57	5.35	69
ตรัง	12	14.46	65	22.32	38	6.29	56	8.33	21
นราธิวาส	12	4.78	77	9.07	77	1.84	77	3.92	76
ปัตตานี	12	6.00	75	9.68	76	2.45	76	6.54	54
พัทลุง	12	14.98	61	27.08	18	8.07	39	6.34	57
ยะลา	12	5.67	76	10.07	75	2.93	75	7.50	38
สงขลา	12	9.07	73	18.70	66	7.10	47	5.55	66
สตูล	12	13.85	67	16.01	72	4.62	69	8.00	27
กรุงเทพมหานคร	13	16.22	57	25.54	23	14.06	8	10.33	7

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77
(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.4 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ และฆ่าตัวตาย ปี 2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	อุบัติเหตุจราจร		จมน้ำ		ฆ่าตัวตาย	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	28.84	35	3.37	67	18.37	6
เชียงราย	1	33.10	14	6.52	32	18.01	7
แพร่	1	30.39	26	4.21	58	19.87	5
แม่ฮ่องสอน	1	26.00	48	4.13	60	21.87	2
น่าน	1	25.86	49	6.15	36	19.92	4
พะเยา	1	34.55	8	9.18	9	21.65	3
ลำปาง	1	33.69	13	6.32	34	17.41	8
ลำพูน	1	32.33	18	6.06	37	24.00	1
เพชรบูรณ์	2	29.74	30	5.58	44	12.60	25
ตาก	2	23.56	66	5.66	43	15.52	10
พิษณุโลก	2	32.81	17	6.66	28	13.55	19
สุโขทัย	2	32.30	19	10.71	3	13.99	15
อุตรดิตถ์	2	32.26	20	6.82	26	13.18	20
กำแพงเพชร	3	33.75	12	7.09	21	14.60	13
ชัยนาท	3	41.34	1	6.63	29	11.68	34
นครสวรรค์	3	33.03	15	7.23	20	12.61	24
พิจิตร	3	27.90	42	8.22	17	8.22	61
อุทัยธานี	3	39.06	3	8.99	11	11.78	33
นครนายก	4	30.52	25	6.57	30	8.11	63
นนทบุรี	4	10.53	77	2.94	72	3.17	75
ปทุมธานี	4	18.92	71	3.08	70	6.50	70
พระนครศรีอยุธยา	4	24.66	58	5.25	46	7.69	66
ลพบุรี	4	33.92	11	4.10	61	10.67	41
สระบุรี	4	35.35	7	5.18	47	9.58	51
สิงห์บุรี	4	27.25	44	6.44	33	6.44	71
อ่างทอง	4	34.29	9	5.90	40	9.59	50
เพชรบุรี	5	28.39	40	4.18	59	8.98	57
กาญจนบุรี	5	34.16	10	5.02	49	10.29	48
นครปฐม	5	32.03	21	4.94	50	8.12	62
ประจวบคีรีขันธ์	5	29.12	34	4.08	63	10.76	40
ราชบุรี	5	29.82	29	4.89	51	12.40	27
สมุทรสงคราม	5	24.06	63	5.35	45	12.30	28
สมุทรสาคร	5	19.47	68	5.89	41	6.97	69
สุพรรณบุรี	5	36.56	5	7.02	24	12.59	26
จันทบุรี	6	35.71	6	8.27	16	12.03	30
ฉะเชิงเทรา	6	31.19	22	7.04	23	10.49	44
ชลบุรี	6	24.50	60	2.84	73	8.84	59
ตราด	6	37.65	4	5.97	39	10.56	43
ปราจีนบุรี	6	30.55	24	6.23	35	11.46	35
ระยอง	6	33.00	16	4.49	54	9.37	53
สมุทรปราการ	6	14.46	73	3.04	71	7.27	68
สระแก้ว	6	39.06	2	9.86	6	15.05	11

ตารางที่ 1.4 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ และฆ่าตัวตาย ปี 2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	อุบัติเหตุจราจร		จมน้ำ		ฆ่าตัวตาย	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	25.38	56	8.46	14	14.65	12
ขอนแก่น	7	25.70	51	8.83	12	10.80	39
มหาสารคาม	7	28.60	37	9.36	8	9.36	54
ร้อยเอ็ด	7	26.42	47	9.79	7	11.27	38
เลย	8	29.74	31	4.59	53	12.02	31
นครพนม	8	24.52	59	6.02	38	9.25	56
บึงกาฬ	8	28.55	38	8.57	13	13.80	17
สกลนคร	8	28.44	39	8.31	15	12.69	23
หนองคาย	8	30.98	23	5.69	42	10.39	45
หนองบัวลำภู	8	25.65	53	9.07	10	11.44	36
อุดรธานี	8	23.18	67	6.70	27	12.88	21
ชัยภูมิ	9	29.52	33	7.54	19	13.64	18
นครราชสีมา	9	27.03	45	7.74	18	12.01	32
บุรีรัมย์	9	30.20	28	10.81	2	10.30	47
สุรินทร์	9	25.50	54	10.59	4	10.59	42
มุกดาหาร	10	27.84	43	5.17	48	8.90	58
ยโสธร	10	30.39	27	10.00	5	7.36	67
ศรีสะเกษ	10	29.70	32	10.89	1	10.34	46
อำนาจเจริญ	10	23.80	64	6.95	25	12.83	22
อุบลราชธานี	10	25.47	55	7.04	22	9.30	55
กระบี่	11	25.69	52	3.97	64	7.94	64
ชุมพร	11	28.31	41	6.53	31	15.64	9
นครศรีธรรมราช	11	24.22	62	4.22	57	14.22	14
พังงา	11	25.82	50	1.90	77	8.35	60
ภูเก็ต	11	23.65	65	3.66	65	7.80	65
ระนอง	11	18.93	70	3.34	68	9.46	52
สุราษฎร์ธานี	11	26.56	46	4.69	52	13.98	16
ตรัง	12	28.76	36	4.09	62	11.32	37
นราธิวาส	12	15.33	72	3.31	69	1.72	77
ปัตตานี	12	12.82	75	2.45	74	2.86	76
พัทลุง	12	25.16	57	4.42	55	12.29	29
ยะลา	12	13.91	74	4.39	56	3.48	73
สงขลา	12	24.47	61	3.38	66	9.77	49
สตูล	12	19.09	69	2.15	76	5.54	72
กรุงเทพมหานคร	13	11.83	76	2.30	75	3.47	74

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77

(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.5 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ และโรคเบาหวาน เฉลี่ย ปี 2561-2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		โรคตับ		โรคเบาหวาน	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	20.10	9	18.16	33	21.34	44
เชียงราย	1	22.54	5	18.11	34	17.26	59
แพร่	1	25.01	4	23.45	13	38.55	6
แม่ฮ่องสอน	1	12.60	15	11.64	59	7.69	77
น่าน	1	41.19	1	17.97	35	12.67	70
พะเยา	1	28.24	3	24.12	10	18.40	52
ลำปาง	1	30.67	2	19.15	30	19.76	48
ลำพูน	1	21.22	7	19.34	27	18.34	54
เพชรบูรณ์	2	11.68	21	26.96	3	25.35	32
ตาก	2	15.55	12	17.85	38	12.42	72
พิษณุโลก	2	11.67	22	23.57	12	28.49	21
สุโขทัย	2	12.03	18	25.00	5	25.26	33
อุตรดิตถ์	2	10.16	30	19.57	25	12.05	73
กำแพงเพชร	3	12.48	16	23.35	15	25.00	34
ชัยนาท	3	21.48	6	24.73	7	34.02	14
นครสวรรค์	3	12.43	17	22.13	18	18.66	51
พิจิตร	3	8.87	37	19.52	26	14.63	66
อุทัยธานี	3	11.86	19	17.94	36	22.70	39
นครนายก	4	15.77	11	23.30	16	27.87	25
นนทบุรี	4	4.75	69	9.65	67	11.83	74
ปทุมธานี	4	6.12	57	10.28	64	12.60	71
พระนครศรีอยุธยา	4	8.57	42	13.54	52	22.37	41
ลพบุรี	4	7.77	45	19.27	28	20.30	46
สระบุรี	4	10.19	29	22.01	20	22.82	38
สิงห์บุรี	4	7.37	49	17.49	39	19.27	50
อ่างทอง	4	6.09	60	14.72	47	23.28	36
เพชรบุรี	5	8.17	43	12.24	56	17.04	61
กาญจนบุรี	5	11.22	24	16.36	45	20.09	47
นครปฐม	5	7.68	46	13.16	53	23.82	35
ประจวบคีรีขันธ์	5	8.72	39	11.04	61	12.83	68
ราชบุรี	5	10.16	31	17.88	37	27.36	27
สมุทรสงคราม	5	9.12	34	12.55	55	28.07	23
สมุทรสาคร	5	5.24	66	9.23	70	17.86	57
สุพรรณบุรี	5	10.59	28	17.16	40	30.30	18
จันทบุรี	6	20.40	8	26.22	4	35.20	10
ฉะเชิงเทรา	6	11.69	20	16.64	43	27.49	26
ชลบุรี	6	5.55	65	11.73	58	18.38	53
ตราด	6	14.83	13	21.29	24	23.19	37
ปราจีนบุรี	6	9.15	33	23.41	14	10.77	75
ระยอง	6	7.17	50	16.77	42	16.70	63
สมุทรปราการ	6	6.84	53	12.68	54	26.81	29
สระแก้ว	6	10.61	26	28.86	1	22.03	43

ตารางที่ 1.5 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ และโรคเบาหวาน เฉลี่ย ปี 2561-2566 (ต่อ)


จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		โรคตับ		โรคเบาหวาน	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	7.04	51	24.91	6	46.29	3
ขอนแก่น	7	5.61	64	21.31	23	30.58	17
มหาสารคาม	7	6.35	55	21.32	22	57.79	1
ร้อยเอ็ด	7	7.55	47	23.91	11	53.10	2
เลย	8	8.86	38	19.16	29	26.66	30
นครพนม	8	4.61	71	15.88	46	39.25	5
บึงกาฬ	8	4.54	72	17.15	41	38.09	7
สกลนคร	8	3.86	76	14.11	50	34.72	12
หนองคาย	8	3.47	77	13.98	51	28.02	24
หนองบัวลำภู	8	6.12	58	16.52	44	28.16	22
อุดรธานี	8	5.75	63	18.38	32	36.75	8
ชัยภูมิ	9	6.15	56	22.54	17	30.71	16
นครราชสีมา	9	8.64	40	22.02	19	18.15	55
บุรีรัมย์	9	8.57	41	27.81	2	34.82	11
สุรินทร์	9	3.98	75	24.66	8	19.62	49
มุกดาหาร	10	6.83	54	12.08	57	28.89	20
ยโสธร	10	8.92	36	24.41	9	43.49	4
ศรีสะเกษ	10	4.82	68	21.91	21	17.13	60
อำนาจเจริญ	10	4.52	73	18.88	31	34.52	13
อุบลราชธานี	10	6.11	59	14.72	48	31.42	15
กระบี่	11	7.51	48	5.93	73	16.07	64
ชุมพร	11	9.00	35	10.78	62	14.53	67
นครศรีธรรมราช	11	11.15	25	9.44	68	17.03	62
พังงา	11	10.61	27	8.97	71	18.12	56
ภูเก็ต	11	4.46	74	8.21	72	10.15	76
ระนอง	11	13.53	14	11.38	60	17.72	58
สุราษฎร์ธานี	11	10.09	32	10.20	65	15.38	65
ตรัง	12	11.52	23	10.61	63	27.11	28
นราธิวาส	12	5.87	62	4.38	77	29.08	19
ปัตตานี	12	16.38	10	4.81	75	36.54	9
พัทลุง	12	7.81	44	14.15	49	20.68	45
ยะลา	12	4.62	70	4.65	76	22.48	40
สงขลา	12	7.01	52	9.67	66	22.15	42
สตูล	12	6.09	61	5.21	74	26.20	31
กรุงเทพมหานคร	13	4.86	67	9.44	69	12.75	69

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77
(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.6 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง เฉลี่ย ปี 2561-2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคหัวใจขาดเลือด		โรคหลอดเลือดสมอง		โรคไตวายเรื้อรัง	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	28.91	52	51.84	47	21.13	20
เชียงราย	1	23.38	71	49.39	51	25.34	12
แพร่	1	45.83	11	76.14	6	31.95	7
แม่ฮ่องสอน	1	16.83	76	39.89	72	8.93	70
น่าน	1	41.12	16	62.04	23	43.26	2
พะเยา	1	50.57	7	65.46	18	37.11	3
ลำปาง	1	46.33	10	81.19	3	45.42	1
ลำพูน	1	48.65	8	56.37	34	25.60	11
เพชรบูรณ์	2	28.33	56	61.81	24	18.81	27
ตาก	2	27.32	58	43.79	60	11.10	61
พิษณุโลก	2	43.85	13	78.95	4	19.17	26
สุโขทัย	2	39.05	22	69.80	12	22.45	18
อุตรดิตถ์	2	60.49	2	70.94	10	28.83	9
กำแพงเพชร	3	32.35	41	65.52	17	20.09	22
ชัยนาท	3	64.43	1	97.01	1	23.28	17
นครสวรรค์	3	37.83	26	82.62	2	20.67	21
พิจิตร	3	37.41	27	62.10	22	14.82	47
อุทัยธานี	3	37.37	28	67.53	14	15.03	45
นครนายก	4	53.04	4	77.37	5	17.25	31
นนทบุรี	4	35.66	35	44.04	59	11.82	60
ปทุมธานี	4	34.94	37	43.40	63	13.10	52
พระนครศรีอยุธยา	4	52.85	5	60.60	26	9.52	68
ลพบุรี	4	39.76	17	63.71	20	15.87	41
สระบุรี	4	39.03	23	71.20	8	12.99	54
สิงห์บุรี	4	37.33	29	65.67	16	16.03	38
อ่างทอง	4	57.24	3	71.11	9	14.54	48
เพชรบุรี	5	34.98	36	42.95	64	10.95	65
กาญจนบุรี	5	37.25	31	53.41	39	14.93	46
นครปฐม	5	37.91	25	57.91	32	12.35	58
ประจวบคีรีขันธ์	5	29.26	51	38.53	74	10.98	64
ราชบุรี	5	39.48	18	61.13	25	14.26	49
สมุทรสงคราม	5	44.83	12	57.38	33	15.18	44
สมุทรสาคร	5	28.66	54	46.10	56	7.45	76
สุพรรณบุรี	5	41.84	15	73.21	7	20.02	24
จันทบุรี	6	31.26	44	69.74	13	18.46	28
ฉะเชิงเทรา	6	36.23	34	52.75	41	15.27	43
ชลบุรี	6	26.93	60	43.64	62	13.67	50
ตราด	6	42.35	14	56.19	35	16.88	33
ปราจีนบุรี	6	28.88	53	64.17	19	15.98	39
ระยอง	6	31.49	43	45.60	57	13.57	51
สมุทรปราการ	6	36.46	32	52.64	43	13.09	53
สระแก้ว	6	25.10	66	59.45	30	16.99	32

ตารางที่ 1.6 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และไตวายเรื้อรัง เฉลี่ย ปี 2561-2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	โรคหัวใจขาดเลือด		โรคหลอดเลือดสมอง		โรคไตวายเรื้อรัง	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	25.63	64	50.91	49	33.28	5
ขอนแก่น	7	24.83	67	51.26	48	20.03	23
มหาสารคาม	7	25.11	65	55.66	37	25.20	13
ร้อยเอ็ด	7	26.84	61	59.97	29	24.35	14
เลย	8	30.17	48	60.55	27	32.77	6
นครพนม	8	24.10	68	41.98	65	22.14	19
บึงกาฬ	8	31.21	45	43.70	61	16.55	34
สกลนคร	8	16.21	77	40.76	70	19.31	25
หนองคาย	8	22.08	73	40.50	71	11.90	59
หนองบัวลำภู	8	28.45	55	48.01	52	31.56	8
อุดรธานี	8	23.11	72	52.64	44	18.14	29
ชัยภูมิ	9	29.70	50	56.13	36	16.40	35
นครราชสีมา	9	27.55	57	58.74	31	16.16	36
บุรีรัมย์	9	26.67	62	70.93	11	17.96	30
สุรินทร์	9	21.03	75	53.19	40	12.42	56
มุกดาหาร	10	21.87	74	41.07	67	36.11	4
ยโสธร	10	39.28	20	60.04	28	25.66	10
ศรีสะเกษ	10	23.99	69	40.81	69	16.14	37
อำนาจเจริญ	10	25.84	63	54.69	38	23.98	15
อุบลราชธานี	10	27.06	59	47.39	53	23.48	16
กระบี่	11	34.24	38	39.85	73	12.38	57
ชุมพร	11	39.05	21	49.43	50	7.48	75
นครศรีธรรมราช	11	48.51	9	52.38	45	11.07	63
พังงา	11	39.34	19	52.03	46	15.97	40
ภูเก็ต	11	23.80	70	30.90	77	10.60	66
ระนอง	11	33.67	39	40.95	68	6.62	77
สุราษฎร์ธานี	11	31.56	42	46.53	54	9.80	67
ตรัง	12	38.11	24	62.30	21	9.51	69
นราธิวาส	12	29.99	49	36.95	75	8.22	72
ปัตตานี	12	52.03	6	66.41	15	15.46	42
พัทลุง	12	37.32	30	52.65	42	8.00	73
ยะลา	12	30.20	47	33.36	76	7.53	74
สงขลา	12	32.67	40	46.44	55	8.81	71
สตูล	12	31.00	46	41.67	66	11.09	62
กรุงเทพมหานคร	13	36.43	33	45.33	58	12.84	55

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77

(สูงสุด) (ต่ำสุด)


ตารางที่ 1.7 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม
เฉลี่ย ปี 2561-2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	มะเร็งตับและท่อน้ำดี		มะเร็งปอด		มะเร็งลำไส้ใหญ่		มะเร็งเต้านม	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	26.02	31	33.52	6	6.84	46	7.25	34
เชียงราย	1	31.04	19	32.77	7	8.71	33	5.67	56
แพร่	1	44.95	3	36.64	5	8.92	27	9.07	14
แม่ฮ่องสอน	1	12.67	68	22.16	39	3.32	73	3.46	77
น่าน	1	28.67	23	38.21	4	9.79	21	7.19	38
พะเยา	1	41.12	8	41.05	3	8.80	30	7.52	29
ลำปาง	1	32.25	17	44.11	1	13.26	5	8.91	18
ลำพูน	1	27.35	26	41.07	2	8.71	32	8.30	22
เพชรบูรณ์	2	46.14	2	24.04	22	7.11	44	6.98	39
ตาก	2	21.31	44	29.62	9	5.12	61	4.78	71
พิษณุโลก	2	24.41	37	23.80	23	9.50	22	8.95	17
สุโขทัย	2	29.11	22	29.67	8	8.83	28	8.35	20
อุตรดิตถ์	2	25.97	32	28.64	11	8.70	34	8.59	19
กำแพงเพชร	3	26.51	29	24.49	20	7.63	39	7.22	35
ชัยนาท	3	27.62	24	27.78	13	14.35	3	10.12	4
นครสวรรค์	3	25.78	33	27.68	14	11.71	8	8.99	15
พิจิตร	3	26.66	28	24.19	21	8.30	36	7.49	30
อุทัยธานี	3	18.97	51	23.52	25	8.79	31	6.95	40
นครนายก	4	23.11	39	25.55	15	12.87	6	9.46	9
นนทบุรี	4	16.55	58	23.11	30	14.82	1	11.58	1
ปทุมธานี	4	15.07	63	20.10	54	11.34	9	9.82	5
พระนครศรีอยุธยา	4	20.38	48	22.21	37	10.24	17	9.14	13
ลพบุรี	4	25.34	34	20.57	52	9.22	25	8.26	23
สระบุรี	4	22.35	42	22.17	38	10.93	15	8.97	16
สิงห์บุรี	4	26.72	27	24.86	19	13.68	4	9.80	6
อ่างทอง	4	19.54	50	24.91	18	11.04	14	7.42	31
เพชรบุรี	5	16.94	56	22.99	32	7.37	41	9.60	7
กาญจนบุรี	5	16.97	55	21.16	44	11.16	11	7.41	32
นครปฐม	5	17.55	53	21.71	41	10.57	16	9.25	12
ประจวบคีรีขันธ์	5	14.75	64	19.89	56	8.81	29	7.82	26
ราชบุรี	5	20.82	47	24.97	17	11.04	13	8.22	24
สมุทรสงคราม	5	22.55	41	28.07	12	11.05	12	10.53	3
สมุทรสาคร	5	15.41	61	23.28	26	9.47	24	8.11	25
สุพรรณบุรี	5	21.20	45	23.75	24	11.25	10	9.59	8
จันทบุรี	6	23.78	38	29.00	10	9.82	20	9.45	10
ฉะเชิงเทรา	6	18.15	52	21.33	42	10.15	19	8.34	21
ชลบุรี	6	15.80	60	18.18	64	8.34	35	7.78	27
ตราด	6	24.94	36	23.19	28	10.19	18	6.08	51
ปราจีนบุรี	6	27.39	25	22.49	36	9.49	23	7.40	33
ระยอง	6	16.45	59	18.54	63	7.37	40	7.21	36
สมุทรปราการ	6	19.67	49	22.08	40	12.04	7	9.36	11
สระแก้ว	6	36.31	11	20.99	45	8.02	37	5.58	59

ตารางที่ 1.7 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม
เฉลี่ย ปี 2561-2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	มะเร็งตับและท่อน้ำดี		มะเร็งปอด		มะเร็งลำไส้ใหญ่		มะเร็งเต้านม	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	47.60	1	20.80	47	5.49	56	5.85	55
ขอนแก่น	7	32.31	15	19.84	57	5.45	57	6.40	46
มหาสารคาม	7	34.80	12	20.15	53	5.21	60	5.93	53
ร้อยเอ็ด	7	42.31	6	23.18	29	7.29	42	6.19	49
เลย	8	30.91	20	22.70	34	6.89	45	6.66	44
นครพนม	8	43.68	5	19.91	55	4.17	68	5.89	54
บึงกาฬ	8	26.16	30	17.38	67	3.20	74	5.02	69
สกลนคร	8	43.89	4	19.70	58	4.63	65	5.39	61
หนองคาย	8	31.91	18	23.22	27	2.95	75	5.22	63
หนองบัวลำภู	8	41.44	7	23.03	31	4.32	67	5.20	64
อุดรธานี	8	32.54	14	20.71	49	3.97	69	5.36	62
ชัยภูมิ	9	33.09	13	19.23	62	6.12	49	6.42	45
นครราชสีมา	9	22.86	40	20.69	51	9.03	26	7.20	37
บุรีรัมย์	9	21.94	43	17.29	68	7.18	43	5.58	58
สุรินทร์	9	20.89	46	15.09	72	5.70	53	4.87	70
มุกดาหาร	10	32.28	16	19.44	60	4.78	63	5.06	67
ยโสธร	10	40.40	9	19.36	61	5.39	59	6.14	50
ศรีสะเกษ	10	30.08	21	17.24	69	4.94	62	4.55	76
อำนาจเจริญ	10	37.27	10	17.77	66	4.48	66	5.58	57
อุบลราชธานี	10	25.29	35	16.41	70	4.75	64	4.72	72
กระบี่	11	10.17	73	14.49	73	3.72	71	4.60	74
ชุมพร	11	15.09	62	22.64	35	5.87	51	6.36	47
นครศรีธรรมราช	11	12.97	67	20.98	46	5.69	54	6.68	43
พังงา	11	16.61	57	22.98	33	6.12	48	7.70	28
ภูเก็ต	11	11.30	72	16.17	71	8.00	38	6.93	41
ระนอง	11	13.53	66	19.68	59	5.50	55	5.13	66
สุราษฎร์ธานี	11	14.08	65	20.69	50	5.89	50	5.20	65
ตรัง	12	12.02	70	20.72	48	5.45	58	6.72	42
นราธิวาส	12	4.77	77	8.89	76	2.42	77	4.69	73
ปัตตานี	12	6.42	75	9.55	75	3.41	72	5.04	68
พัทลุง	12	12.14	69	21.16	43	5.77	52	5.45	60
ยะลา	12	5.61	76	8.68	77	2.85	76	4.56	75
สงขลา	12	10.04	74	18.15	65	6.24	47	5.98	52
สตูล	12	11.76	71	14.13	74	3.82	70	6.34	48
กรุงเทพมหานคร	13	17.46	54	25.20	16	14.82	2	11.02	2

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77

(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.8 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ และฆ่าตัวตาย เฉลี่ย ปี 2561-2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	อุบัติเหตุจราจร		จมน้ำ		ฆ่าตัวตาย	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	26.91	52	3.86	65	16.53	7
เชียงราย	1	32.03	23	5.87	39	16.50	8
แพร่	1	29.28	37	5.57	46	17.58	4
แม่ฮ่องสอน	1	22.16	66	4.02	63	20.64	1
น่าน	1	27.44	49	4.42	58	18.49	3
พะเยา	1	32.96	18	5.87	40	17.32	5
ลำปาง	1	30.78	28	5.34	48	15.71	9
ลำพูน	1	33.85	14	5.59	45	20.14	2
เพชรบูรณ์	2	34.60	13	5.99	36	12.99	13
ตาก	2	23.12	64	5.70	43	16.77	6
พิษณุโลก	2	34.67	12	6.41	33	10.71	30
สุโขทัย	2	31.09	26	7.87	9	12.94	14
อุตรดิตถ์	2	32.29	20	6.81	27	13.62	10
กำแพงเพชร	3	36.80	7	7.49	13	10.80	28
ชัยนาท	3	38.62	4	7.18	21	12.34	17
นครสวรรค์	3	32.14	21	7.94	8	11.42	23
พิจิตร	3	33.59	15	7.14	22	8.55	57
อุทัยธานี	3	37.57	6	7.05	25	10.58	32
นครนายก	4	35.34	10	7.08	24	7.72	62
นนทบุรี	4	12.77	76	2.76	76	3.82	73
ปทุมธานี	4	18.69	70	3.03	75	6.03	70
พระนครศรีอยุธยา	4	26.15	58	5.26	50	5.83	71
ลพบุรี	4	35.82	9	5.26	51	11.22	25
สระบุรี	4	36.05	8	4.60	57	9.17	48
สิงห์บุรี	4	30.28	31	5.75	42	9.80	40
อ่างทอง	4	30.16	32	6.51	30	8.93	52
เพชรบุรี	5	30.05	34	4.90	53	8.62	55
กาญจนบุรี	5	33.29	16	5.98	37	10.59	31
นครปฐม	5	28.86	43	5.39	47	6.62	68
ประจวบคีรีขันธ์	5	33.18	17	3.59	69	9.19	46
ราชบุรี	5	29.34	36	4.76	55	8.91	53
สมุทรสงคราม	5	20.00	69	7.54	12	6.84	67
สมุทรสาคร	5	17.65	71	4.39	59	6.96	66
สุพรรณบุรี	5	38.95	2	7.13	23	10.15	36
จันทบุรี	6	38.89	3	7.76	10	13.58	11
ฉะเชิงเทรา	6	31.81	24	7.30	16	9.18	47
ชลบุรี	6	25.40	61	3.06	74	7.22	64
ตราด	6	37.94	5	6.92	26	11.25	24
ปราจีนบุรี	6	34.72	11	7.67	11	9.25	45
ระยอง	6	32.51	19	4.97	52	8.69	54
สมุทรปราการ	6	13.09	75	3.36	70	5.39	72
สระแก้ว	6	43.65	1	10.29	1	12.58	15

ตารางที่ 1.8 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ และฆ่าตัวตาย เฉลี่ย ปี 2561-2566 (ต่อ)


จังหวัด	เขตสุขภาพ	อุบัติเหตุจราจร		จมน้ำ		ฆ่าตัวตาย	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	28.69	45	7.23	18	11.93	19
ขอนแก่น	7	26.18	56	7.18	20	10.30	35
มหาสารคาม	7	29.17	40	7.36	15	9.08	49
ร้อยเอ็ด	7	27.74	47	8.00	7	9.00	50
เลย	8	28.89	42	6.42	32	13.16	12
นครพนม	8	26.38	55	6.50	31	9.38	43
บึงกาฬ	8	31.69	25	8.26	5	11.54	22
สกลนคร	8	26.60	54	7.25	17	10.75	29
หนองคาย	8	27.66	48	5.67	44	7.46	63
หนองบัวลำภู	8	26.03	60	6.70	28	10.92	26
อุดรธานี	8	24.64	62	6.69	29	10.52	33
ชัยภูมิ	9	30.74	29	8.11	6	12.23	18
นครราชสีมา	9	30.15	33	7.21	19	10.08	38
บุรีรัมย์	9	31.01	27	10.15	2	10.11	37
สุรินทร์	9	27.74	46	10.09	3	8.94	51
มุกดาหาร	10	28.85	44	6.35	34	9.46	42
ยโสธร	10	32.14	22	7.39	14	8.14	61
ศรีสะเกษ	10	29.26	38	8.97	4	9.86	39
อำนาจเจริญ	10	29.12	41	6.20	35	9.26	44
อุบลราชธานี	10	27.36	50	5.84	41	8.17	60
กระบี่	11	26.73	53	3.16	72	8.49	58
ชุมพร	11	30.45	30	5.31	49	11.73	21
นครศรีธรรมราช	11	26.11	59	4.79	54	11.93	20
พังงา	11	29.36	35	4.23	61	8.59	56
ภูเก็ต	11	20.75	68	3.18	71	7.10	65
ระนอง	11	23.51	63	4.76	56	9.61	41
สุราษฎร์ธานี	11	26.16	57	4.38	60	10.48	34
ตรัง	12	29.25	39	4.22	62	10.87	27
นราธิวาส	12	17.50	72	3.14	73	1.47	77
ปัตตานี	12	14.89	73	3.87	64	2.26	76
พัทลุง	12	27.06	51	5.90	38	12.43	16
ยะลา	12	14.51	74	3.66	67	3.19	75
สงขลา	12	22.93	65	3.62	68	8.30	59
สตูล	12	21.51	67	3.77	66	6.40	69
กรุงเทพมหานคร	13	10.37	77	2.23	77	3.29	74

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77
(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.9 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด รวม 13 สาเหตุ ปี 2566 และ เฉลี่ย ปี 2561-2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	รวม 13 สาเหตุ (ปี 2566)		รวม 13 สาเหตุ (ปี 2561-2566)	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
เชียงใหม่	1	284.15	27	282.41	29
เชียงราย	1	278.72	31	288.62	26
แพร่	1	383.10	4	392.96	2
แม่ฮ่องสอน	1	192.72	73	186.03	74
น่าน	1	329.14	10	352.46	5
พะเยา	1	404.30	3	378.55	4
ลำปาง	1	411.35	2	392.87	3
ลำพูน	1	308.42	20	334.53	7
เพชรบูรณ์	2	327.04	12	310.80	17
ตาก	2	226.79	59	234.45	54
พิษณุโลก	2	334.59	8	324.14	10
สุโขทัย	2	318.48	17	321.47	11
อุตรดิตถ์	2	360.10	5	326.65	9
กำแพงเพชร	3	303.01	21	299.72	20
ชัยนาท	3	428.84	1	402.95	1
นครสวรรค์	3	350.80	6	320.01	13
พิจิตร	3	246.90	51	273.29	35
อุทัยธานี	3	295.12	24	285.87	27
นครนายก	4	325.67	13	335.75	6
นนทบุรี	4	196.24	72	203.16	69
ปทุมธานี	4	202.34	69	204.51	68
พระนครศรีอยุธยา	4	258.83	42	266.66	38
ลพบุรี	4	272.62	38	282.37	30
สระบุรี	4	297.54	23	292.47	24
สิงห์บุรี	4	277.97	32	284.04	28
อ่างทอง	4	290.16	25	295.49	21
เพชรบุรี	5	213.17	64	226.81	61
กาญจนบุรี	5	257.76	46	259.82	42
นครปฐม	5	246.38	53	252.79	47
ประจวบคีรีขันธ์	5	205.11	67	208.60	64
ราชบุรี	5	276.23	35	278.34	31
สมุทรสงคราม	5	277.48	33	273.72	34
สมุทรสาคร	5	197.90	71	199.81	71
สุพรรณบุรี	5	324.60	14	315.14	16
จันทบุรี	6	333.65	9	333.55	8
ฉะเชิงเทรา	6	270.10	39	266.32	39
ชลบุรี	6	206.93	66	205.69	66
ตราด	6	282.40	28	295.27	22
ปราจีนบุรี	6	249.25	49	270.78	37
ระยอง	6	226.38	60	227.03	60
สมุทรปราการ	6	236.89	55	233.52	55
สระแก้ว	6	311.79	18	300.47	19

ตารางที่ 1.9 อัตราตายและอันดับที่ของจังหวัด รวม 13 สาเหตุ ปี 2566 และ เฉลี่ย ปี 2561-2566 (ต่อ)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	รวม 13 สาเหตุ (ปี 2566)		รวม 13 สาเหตุ (ปี 2561-2566)	
		อัตราตาย	อันดับที่	อัตราตาย	อันดับที่
กาฬสินธุ์	7	336.19	7	315.65	15
ขอนแก่น	7	274.21	37	261.29	41
มหาสารคาม	7	319.74	16	303.12	18
ร้อยเอ็ด	7	322.37	15	319.42	14
เลย	8	302.60	22	293.80	23
นครพนม	8	275.87	36	263.86	40
บึงกาฬ	8	257.23	47	254.48	45
สกลนคร	8	260.69	41	247.17	49
หนองคาย	8	258.23	44	224.04	62
หนองบัวลำภู	8	281.71	29	276.47	33
อุดรธานี	8	280.42	30	259.21	43
ชัยภูมิ	9	289.58	26	277.57	32
นครราชสีมา	9	264.09	40	258.49	44
บุรีรัมย์	9	310.91	19	290.02	25
สุรินทร์	9	231.16	56	228.23	58
มุกดาหาร	10	258.02	45	253.07	46
ยโสธร	10	328.95	11	320.76	12
ศรีสะเกษ	10	239.61	54	229.70	57
อำนาจเจริญ	10	258.30	43	272.11	36
อุบลราชธานี	10	246.85	52	242.71	50
กระบี่	11	177.30	74	187.31	73
ชุมพร	11	226.87	58	227.71	59
นครศรีธรรมราช	11	255.38	48	238.72	52
พังงา	11	223.63	61	240.63	51
ภูเก็ต	11	171.42	75	161.54	75
ระนอง	11	207.07	65	205.59	67
สุราษฎร์ธานี	11	217.80	62	210.44	63
ตรัง	12	276.78	34	248.40	48
นราธิวาส	12	144.21	76	157.37	76
ปัตตานี	12	230.95	57	237.07	53
พัทลุง	12	249.06	50	230.51	56
ยะลา	12	142.40	77	145.92	77
สงขลา	12	215.45	63	202.01	70
สตูล	12	204.09	68	188.98	72
กรุงเทพมหานคร	13	202.00	70	206.03	65

อัตราตายต่อแสนประชากร



ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด

อันดับที่ของจังหวัด



อันดับที่ 1 อันดับที่ 77
(สูงสุด) (ต่ำสุด)

ตารางที่ 1.10 สาเหตุการตายที่มีอัตราตายของจังหวัด ติดอันดับ 1-40 ของประเทศ ปี 2566

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
เชียงใหม่	1	มะเร็งปอด (4)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (9) ฆ่าตัวตาย (6)		โรคตับ (35) โรคเบาหวาน (40) โรคไตวายเรื้อรัง (30) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (24) อุบัติเหตุจากรถ (35)
เชียงราย	1	มะเร็งปอด (5)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (7) ฆ่าตัวตาย (7)	อุบัติเหตุจากรถ (14)	โรคไตวายเรื้อรัง (22) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (21) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (24) จมน้ำ (32)
แพร่	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (5) โรคตับ (4) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (3) มะเร็งปอด (3) ฆ่าตัวตาย (5)	โรคหลอดเลือดสมอง (8) โรคไตวายเรื้อรัง (7) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (10)	โรคเบาหวาน (20) โรคหัวใจขาดเลือด (15) มะเร็งเต้านม (19)	อุบัติเหตุจากรถ (26)
แม่ฮ่องสอน	1	ฆ่าตัวตาย (2)			โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (36) มะเร็งปอด (26)
น่าน	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1) โรคไตวายเรื้อรัง (1) ฆ่าตัวตาย (4)	มะเร็งปอด (6)	โรคหลอดเลือดสมอง (19)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (26) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (33) จมน้ำ (36)
พะเยา	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (3) โรคตับ (1) โรคไตวายเรื้อรัง (4) มะเร็งปอด (2) ฆ่าตัวตาย (3)	โรคหัวใจขาดเลือด (9) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (6) อุบัติเหตุจากรถ (8) จมน้ำ (9)	โรคหลอดเลือดสมอง (18) มะเร็งเต้านม (15)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (22)
ลำปาง	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (2) โรคหลอดเลือดสมอง (2) โรคไตวายเรื้อรัง (3) มะเร็งปอด (1) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (3)	โรคหัวใจขาดเลือด (10) มะเร็งเต้านม (6) ฆ่าตัวตาย (8)	โรคตับ (20) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (13) อุบัติเหตุจากรถ (13)	จมน้ำ (34)
ลำพูน	1	ฆ่าตัวตาย (1)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (8) โรคหัวใจขาดเลือด (8) มะเร็งปอด (7)	อุบัติเหตุจากรถ (18)	โรคตับ (34) โรคไตวายเรื้อรัง (32) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (37) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (36) จมน้ำ (37)
เพชรบูรณ์	2	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (1)	โรคตับ (6)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (16) โรคหลอดเลือดสมอง (12)	โรคเบาหวาน (26) โรคไตวายเรื้อรัง (23) มะเร็งปอด (25) มะเร็งเต้านม (23) อุบัติเหตุจากรถ (30) ฆ่าตัวตาย (25)
ตาก	2		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (10) ฆ่าตัวตาย (10)	มะเร็งปอด (11)	โรคตับ (31)
พิษณุโลก	2	โรคหลอดเลือดสมอง (4)	โรคตับ (10) มะเร็งเต้านม (9)	โรคหัวใจขาดเลือด (14) โรคไตวายเรื้อรัง (18) อุบัติเหตุจากรถ (17) ฆ่าตัวตาย (19)	โรคเบาหวาน (21) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (22) มะเร็งปอด (37) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (23) จมน้ำ (28)
สุโขทัย	2	จมน้ำ (3)	โรคหลอดเลือดสมอง (10) มะเร็งปอด (9)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (18) โรคไตวายเรื้อรัง (17) อุบัติเหตุจากรถ (19) ฆ่าตัวตาย (15)	โรคตับ (22) โรคเบาหวาน (35) โรคหัวใจขาดเลือด (31) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (31) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (28)
อุตรดิตถ์	2	โรคหัวใจขาดเลือด (1)	มะเร็งปอด (8)	โรคตับ (19) โรคหลอดเลือดสมอง (17) โรคไตวายเรื้อรัง (13) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (15) อุบัติเหตุจากรถ (20) ฆ่าตัวตาย (20)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (34) มะเร็งเต้านม (29) จมน้ำ (26)

จังหวัด	เขต สุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติด อันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติด อันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติด อันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติด อันดับ 21-40 ของประเทศ
กำแพงเพชร	3			โรคหลอดเลือดสมอง (20) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (17) อุบัติเหตุจากรถ (12) ฆ่าตัวตาย (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (26) โรคตับ (21) โรคเบาหวาน (24) โรคไตวายเรื้อรัง (24) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (23) มะเร็งปอด (30) มะเร็งเต้านม (25) จมน้ำ (21)
ชัยนาท	3	โรคหัวใจขาดเลือด (2) โรคหลอดเลือดสมอง (1) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (5) มะเร็งเต้านม (2) อุบัติเหตุจากรถ (1)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (6)	โรคตับ (12) โรคเบาหวาน (14) โรคไตวายเรื้อรัง (19) มะเร็งปอด (16)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (22) จมน้ำ (29) ฆ่าตัวตาย (34)
นครสวรรค์	3	โรคหลอดเลือดสมอง (3)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (6) มะเร็งเต้านม (8)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (12) โรคตับ (14) โรคหัวใจขาดเลือด (11) โรคไตวายเรื้อรัง (11) มะเร็งปอด (13) อุบัติเหตุจากรถ (15) จมน้ำ (20)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (29) ฆ่าตัวตาย (24)
พิจิตร	3			โรคหัวใจขาดเลือด (19) จมน้ำ (17)	โรคไตวายเรื้อรัง (37) มะเร็งปอด (35) มะเร็งเต้านม (39)
อุทัยธานี	3	อุบัติเหตุจากรถ (3)		โรคหลอดเลือดสมอง (11) มะเร็งปอด (15) มะเร็งเต้านม (20) จมน้ำ (11)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (25) โรคเบาหวาน (31) โรคหัวใจขาดเลือด (34) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (26) ฆ่าตัวตาย (33)
นครนายก	4	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (4)	โรคหัวใจขาดเลือด (6) โรคหลอดเลือดสมอง (6)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (11) มะเร็งปอด (17) มะเร็งเต้านม (17)	โรคตับ (25) โรคเบาหวาน (32) โรคไตวายเรื้อรัง (39) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (33) อุบัติเหตุจากรถ (25) จมน้ำ (30)
นนทบุรี	4	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (2) มะเร็งเต้านม (3)			โรคหัวใจขาดเลือด (36) มะเร็งปอด (31)
ปทุมธานี	4			มะเร็งลำไส้ใหญ่ (18) มะเร็งเต้านม (11)	โรคหัวใจขาดเลือด (29)
พระนครศรีอยุธยา	4	โรคหัวใจขาดเลือด (4)			โรคหลอดเลือดสมอง (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (31)
ลพบุรี	4			อุบัติเหตุจากรถ (11)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (38) โรคตับ (38) โรคเบาหวาน (39) โรคหัวใจขาดเลือด (28) โรคหลอดเลือดสมอง (26) โรคไตวายเรื้อรัง (38) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (39) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (37) มะเร็งเต้านม (30)
สระบุรี	4		โรคหลอดเลือดสมอง (7) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (9) อุบัติเหตุจากรถ (7)	โรคหัวใจขาดเลือด (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (28) โรคตับ (28) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (28) มะเร็งปอด (28)
สิงห์บุรี	4	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (1)	มะเร็งเต้านม (10)	โรคหลอดเลือดสมอง (16) มะเร็งปอด (12)	โรคหัวใจขาดเลือด (25) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (35) จมน้ำ (33)
อ่างทอง	4	โรคหัวใจขาดเลือด (3)	อุบัติเหตุจากรถ (9)	โรคหลอดเลือดสมอง (13)	โรคเบาหวาน (23) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (21) จมน้ำ (40)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
เพชรบุรี	5	มะเร็งเต้านม (5)			อุบัติเหตุจากรถ (40)
กาญจนบุรี	5		อุบัติเหตุจากรถ (10)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (24) โรคตับ (40) โรคหัวใจขาดเลือด (33)
นครปฐม	5			มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19) มะเร็งเต้านม (12)	โรคหัวใจขาดเลือด (32) โรคหลอดเลือดสมอง (35) อุบัติเหตุจากรถ (21)
ประจวบคีรีขันธ์	5				มะเร็งลำไส้ใหญ่ (27) มะเร็งเต้านม (32) อุบัติเหตุจากรถ (34) ฆ่าตัวตาย (40)
ราชบุรี	5			มะเร็งลำไส้ใหญ่ (12)	โรคตับ (30) โรคเบาหวาน (34) โรคหัวใจขาดเลือด (21) โรคหลอดเลือดสมอง (27) มะเร็งปอด (27) มะเร็งเต้านม (37) อุบัติเหตุจากรถ (29) ฆ่าตัวตาย (27)
สมุทรสงคราม	5	มะเร็งเต้านม (1)		โรคหัวใจขาดเลือด (12) มะเร็งปอด (14) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (16)	โรคเบาหวาน (36) โรคหลอดเลือดสมอง (37) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (30) ฆ่าตัวตาย (28)
สมุทรสาคร	5				โรคหัวใจขาดเลือด (39) มะเร็งปอด (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (30)
สุพรรณบุรี	5	โรคหลอดเลือดสมอง (5) อุบัติเหตุจากรถ (5)		โรคเบาหวาน (12) โรคหัวใจขาดเลือด (17) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (15) มะเร็งเต้านม (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (27) โรคไตวายเรื้อรัง (27) มะเร็งปอด (21) จมน้ำ (24) ฆ่าตัวตาย (26)
จันทบุรี	6	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (4) มะเร็งเต้านม (4)	โรคตับ (7) โรคเบาหวาน (6) อุบัติเหตุจากรถ (6)	โรคหลอดเลือดสมอง (15) มะเร็งปอด (19) จมน้ำ (16)	โรคหัวใจขาดเลือด (40) โรคไตวายเรื้อรัง (36) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (38) ฆ่าตัวตาย (30)
ฉะเชิงเทรา	6			โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (13) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (11) มะเร็งเต้านม (18)	โรคตับ (36) โรคเบาหวาน (28) โรคหัวใจขาดเลือด (30) โรคไตวายเรื้อรัง (40) มะเร็งปอด (24) อุบัติเหตุจากรถ (22) จมน้ำ (23)
ชลบุรี	6			มะเร็งเต้านม (16)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (32)
ตราด	6	อุบัติเหตุจากรถ (4)		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (14)	โรคตับ (24) โรคหัวใจขาดเลือด (26) โรคไตวายเรื้อรัง (35) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (38) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (25) มะเร็งเต้านม (31) จมน้ำ (39)
ปราจีนบุรี	6				โรคตับ (26) โรคหลอดเลือดสมอง (33) โรคไตวายเรื้อรัง (29) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (25) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (29) มะเร็งเต้านม (36) อุบัติเหตุจากรถ (24) จมน้ำ (35) ฆ่าตัวตาย (35)
ระยอง	6			อุบัติเหตุจากรถ (16)	โรคตับ (33) มะเร็งเต้านม (33)
สมุทรปราการ	6		มะเร็งลำไส้ใหญ่ (7)		โรคหัวใจขาดเลือด (22) โรคหลอดเลือดสมอง (39) มะเร็งปอด (33) มะเร็งเต้านม (22)
สระแก้ว	6	โรคตับ (2) อุบัติเหตุจากรถ (2)	จมน้ำ (6)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (19) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (12) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (14) ฆ่าตัวตาย (11)	โรคเบาหวาน (29) โรคหลอดเลือดสมอง (30) โรคไตวายเรื้อรัง (21)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
กาฬสินธุ์	7	โรคเบาหวาน (3) โรคไตวายเรื้อรัง (5) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (2)		โรคตับ (11) จมน้ำ (14) ฆ่าตัวตาย (12)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (39) โรคหลอดเลือดสมอง (34)
ขอนแก่น	7			โรคไตวายเรื้อรัง (20) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (18) จมน้ำ (12)	โรคตับ (23) โรคเบาหวาน (27) โรคหลอดเลือดสมอง (36) มะเร็งเต้านม (26) ฆ่าตัวตาย (39)
มหาสารคาม	7	โรคเบาหวาน (1)	จมน้ำ (8)	โรคตับ (16) โรคไตวายเรื้อรัง (14) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (14)	โรคหลอดเลือดสมอง (23) มะเร็งเต้านม (28) อุบัติเหตุจากรถ (37)
ร้อยเอ็ด	7	โรคเบาหวาน (2)	โรคไตวายเรื้อรัง (9) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (8) จมน้ำ (7)	โรคตับ (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (40) โรคหลอดเลือดสมอง (24) มะเร็งปอด (29) ฆ่าตัวตาย (38)
เลย	8		โรคไตวายเรื้อรัง (6) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (10)	มะเร็งปอด (20)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (31) โรคเบาหวาน (22) โรคหลอดเลือดสมอง (25) อุบัติเหตุจากรถ (31) ฆ่าตัวตาย (31)
นครพนม	8	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (5)	โรคเบาหวาน (7) โรคไตวายเรื้อรัง (10)		โรคตับ (32) มะเร็งเต้านม (35) จมน้ำ (38)
บึงกาฬ	8		โรคเบาหวาน (8)	จมน้ำ (13) ฆ่าตัวตาย (17)	โรคไตวายเรื้อรัง (33) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (34) อุบัติเหตุจากรถ (38)
สกลนคร	8	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (4)	โรคเบาหวาน (9)	จมน้ำ (15)	โรคตับ (39) โรคไตวายเรื้อรัง (31) อุบัติเหตุจากรถ (39) ฆ่าตัวตาย (23)
หนองคาย	8			โรคเบาหวาน (16) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (16)	โรคตับ (29) มะเร็งปอด (22) อุบัติเหตุจากรถ (23)
หนองบัวลำภู	8		โรคไตวายเรื้อรัง (8) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (9) มะเร็งปอด (10) จมน้ำ (10)		โรคตับ (37) โรคเบาหวาน (30) ฆ่าตัวตาย (36)
อุดรธานี	8	โรคเบาหวาน (5)		โรคตับ (18) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (11)	โรคหลอดเลือดสมอง (38) โรคไตวายเรื้อรัง (25) มะเร็งปอด (39) จมน้ำ (27) ฆ่าตัวตาย (21)
ชัยภูมิ	9	โรคตับ (5)		โรคเบาหวาน (18) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (19) จมน้ำ (19) ฆ่าตัวตาย (18)	โรคหลอดเลือดสมอง (22) โรคไตวายเรื้อรัง (34) อุบัติเหตุจากรถ (33)
นครราชสีมา	9			โรคตับ (17) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (20) จมน้ำ (18)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (37) โรคหลอดเลือดสมอง (29) มะเร็งปอด (34) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (20) มะเร็งเต้านม (24) ฆ่าตัวตาย (32)
บุรีรัมย์	9	โรคตับ (3) จมน้ำ (2)	โรคเบาหวาน (10) โรคหลอดเลือดสมอง (9)		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (29) โรคหัวใจขาดเลือด (38) โรคไตวายเรื้อรัง (26) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (35) อุบัติเหตุจากรถ (28)
สุรินทร์	9	จมน้ำ (4)	โรคตับ (9)		

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
มุกดาหาร	10	โรคไตวายเรื้อรัง (2)		มะเร็งตับและท่อน้ำดี (20)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (33)
ยโสธร	10	โรคเบาหวาน (4) จมน้ำ (5)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (7)	โรคตับ (15) โรคหัวใจขาดเลือด (20) โรคไตวายเรื้อรัง (12)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (34) โรคหลอดเลือดสมอง (28) มะเร็งเต้านม (34) อุบัติเหตุจากรถ (27)
ศรีสะเกษ	10	จมน้ำ (1)	โรคตับ (8)		โรคไตวายเรื้อรัง (28) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (27) อุบัติเหตุจากรถ (32)
อำนาจเจริญ	10			โรคเบาหวาน (17) โรคไตวายเรื้อรัง (15) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (17)	โรคตับ (27) จมน้ำ (25) ฆ่าตัวตาย (22)
อุบลราชธานี	10			โรคเบาหวาน (15) โรคไตวายเรื้อรัง (16)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (36) จมน้ำ (22)
กระบี่	11				โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (30)
ชุมพร	11		ฆ่าตัวตาย (9)		โรคหัวใจขาดเลือด (35) มะเร็งปอด (36) จมน้ำ (31)
นครศรีธรรมราช	11		โรคหัวใจขาดเลือด (7)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (20) ฆ่าตัวตาย (14)	โรคหลอดเลือดสมอง (40)
พังงา	11			มะเร็งเต้านม (14)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (35) โรคหัวใจขาดเลือด (23)
ภูเก็ต	11				มะเร็งลำไส้ใหญ่ (40)
ระนอง	11				โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (23) โรคเบาหวาน (37) มะเร็งปอด (40)
สุราษฎร์ธานี	11			ฆ่าตัวตาย (16)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (21)
ตรัง	12			โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (15) โรคเบาหวาน (13) โรคหัวใจขาดเลือด (16) โรคหลอดเลือดสมอง (14)	มะเร็งปอด (38) มะเร็งเต้านม (21) อุบัติเหตุจากรถ (36) ฆ่าตัวตาย (37)
นราธิวาส	12				โรคเบาหวาน (25)
ปัตตานี	12	โรคหัวใจขาดเลือด (5)		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (17) โรคเบาหวาน (11)	โรคหลอดเลือดสมอง (21)
พัทลุง	12			โรคหัวใจขาดเลือด (18) มะเร็งปอด (18)	โรคหลอดเลือดสมอง (31) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (39) ฆ่าตัวตาย (29)
ยะลา	12				โรคเบาหวาน (33) มะเร็งเต้านม (38)
สงขลา	12				โรคเบาหวาน (38) โรคหัวใจขาดเลือด (27)
สตูล	12			โรคเบาหวาน (19)	โรคหัวใจขาดเลือด (24) มะเร็งเต้านม (27)
กรุงเทพมหานคร	13		มะเร็งลำไส้ใหญ่ (8) มะเร็งเต้านม (7)		โรคหัวใจขาดเลือด (37) มะเร็งปอด (23)

ตารางที่ 1.11 สาเหตุการตายที่มีอัตราตายของจังหวัด ติดอันดับ 1-40 ของประเทศ ปี 2561-2566 (รวม 6 ปี)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
เชียงใหม่	1		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (9) มะเร็งปอด (6) ฆ่าตัวตาย (7)	โรคไตวายเรื้อรัง (20) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (31) มะเร็งเต้านม (34)	โรคตับ (33) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (31) มะเร็งเต้านม (34)
เชียงราย	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (5)	มะเร็งปอด (7) ฆ่าตัวตาย (8)	โรคไตวายเรื้อรัง (12) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (19)	โรคตับ (34) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (33) อุบัติเหตุจากรถ (23) จมน้ำ (39)
แพร่	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (4) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (3) มะเร็งปอด (5) ฆ่าตัวตาย (4)	โรคเบาหวาน (6) โรคหลอดเลือดสมอง (6) โรคไตวายเรื้อรัง (7)	โรคตับ (13) โรคหัวใจขาดเลือด (11) มะเร็งเต้านม (14)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (27) อุบัติเหตุจากรถ (37)
แม่ฮ่องสอน	1	ฆ่าตัวตาย (1)		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (15)	มะเร็งปอด (39)
น่าน	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (1) โรคไตวายเรื้อรัง (2) มะเร็งปอด (4) ฆ่าตัวตาย (3)		โรคหัวใจขาดเลือด (16)	โรคตับ (35) โรคหลอดเลือดสมอง (23) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (23) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (21) มะเร็งเต้านม (38)
พะเยา	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (3) โรคไตวายเรื้อรัง (3) มะเร็งปอด (3) ฆ่าตัวตาย (5)	โรคตับ (10) โรคหัวใจขาดเลือด (7) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (8)	โรคหลอดเลือดสมอง (18) อุบัติเหตุจากรถ (18)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (30) มะเร็งเต้านม (29)
ลำปาง	1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (2) โรคหลอดเลือดสมอง (3) โรคไตวายเรื้อรัง (1) มะเร็งปอด (1) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (5)	โรคหัวใจขาดเลือด (10) ฆ่าตัวตาย (9)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (17) มะเร็งเต้านม (18)	โรคตับ (30) อุบัติเหตุจากรถ (28)
ลำพูน	1	มะเร็งปอด (2) ฆ่าตัวตาย (2)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (7) โรคหัวใจขาดเลือด (8)	โรคไตวายเรื้อรัง (11) อุบัติเหตุจากรถ (14)	โรคตับ (27) โรคหลอดเลือดสมอง (34) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (26) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (32) มะเร็งเต้านม (22)
เพชรบูรณ์	2	โรคตับ (3) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (2)		อุบัติเหตุจากรถ (13) ฆ่าตัวตาย (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (21) โรคเบาหวาน (32) โรคหลอดเลือดสมอง (24) โรคไตวายเรื้อรัง (27) มะเร็งปอด (22) มะเร็งเต้านม (39) จมน้ำ (36)
ตาก	2		มะเร็งปอด (9) ฆ่าตัวตาย (6)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (12)	โรคตับ (38)
พิษณุโลก	2	โรคหลอดเลือดสมอง (4)		โรคตับ (12) โรคหัวใจขาดเลือด (13) มะเร็งเต้านม (17) อุบัติเหตุจากรถ (12)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (22) โรคเบาหวาน (21) โรคไตวายเรื้อรัง (26) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (37) มะเร็งปอด (23) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (22) จมน้ำ (33) ฆ่าตัวตาย (30)
สุโขทัย	2	โรคตับ (5)	มะเร็งปอด (8) จมน้ำ (9)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (18) โรคหลอดเลือดสมอง (12) โรคไตวายเรื้อรัง (18) มะเร็งเต้านม (20) ฆ่าตัวตาย (14)	โรคเบาหวาน (33) โรคหัวใจขาดเลือด (22) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (22) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (28) อุบัติเหตุจากรถ (26)
อุตรดิตถ์	2	โรคหัวใจขาดเลือด (2)	โรคหลอดเลือดสมอง (10) โรคไตวายเรื้อรัง (9) ฆ่าตัวตาย (10)	มะเร็งปอด (11) อุบัติเหตุจากรถ (20) มะเร็งเต้านม (19) อุบัติเหตุจากรถ (20)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (30) โรคตับ (25) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (34) จมน้ำ (27)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
กำแพงเพชร	3		อุบัติเหตุจากรถ (7)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (16) โรคตับ (15) โรคหลอดเลือดสมอง (17) มะเร็งปอด (20) จมน้ำ (13)	โรคเบาหวาน (34) โรคไตวายเรื้อรัง (22) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (29) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (39) มะเร็งเต้านม (35) ฆ่าตัวตาย (28)
ชัยนาท	3	โรคหัวใจขาดเลือด (1) โรคหลอดเลือดสมอง (1) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (3) มะเร็งเต้านม (4) อุบัติเหตุจากรถ (4)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (6) โรคตับ (7)	โรคเบาหวาน (14) โรคไตวายเรื้อรัง (17) มะเร็งปอด (13) ฆ่าตัวตาย (17)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (24) จมน้ำ (21)
นครสวรรค์	3	โรคหลอดเลือดสมอง (2)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (8) จมน้ำ (8)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (17) โรคตับ (18) มะเร็งปอด (14) มะเร็งเต้านม (15)	โรคหัวใจขาดเลือด (26) โรคไตวายเรื้อรัง (21) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (33) อุบัติเหตุจากรถ (21) ฆ่าตัวตาย (23)
พิจิตร	3			อุบัติเหตุจากรถ (15)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (37) โรคตับ (26) โรคหัวใจขาดเลือด (27) โรคหลอดเลือดสมอง (22) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (28) มะเร็งปอด (21) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (36) มะเร็งเต้านม (30) จมน้ำ (22)
อุทัยธานี	3		อุบัติเหตุจากรถ (6)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (19) โรคหลอดเลือดสมอง (14)	โรคตับ (36) โรคเบาหวาน (39) โรคหัวใจขาดเลือด (28) มะเร็งปอด (25) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (31) มะเร็งเต้านม (40) จมน้ำ (25) ฆ่าตัวตาย (32)
นครนายก	4	โรคหัวใจขาดเลือด (4) โรคหลอดเลือดสมอง (5)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (6) มะเร็งเต้านม (9) อุบัติเหตุจากรถ (10)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (11) โรคตับ (16) มะเร็งปอด (15)	โรคเบาหวาน (25) โรคไตวายเรื้อรัง (31) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (39) จมน้ำ (24)
นนทบุรี	4	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (1) มะเร็งเต้านม (1)			โรคหัวใจขาดเลือด (35) มะเร็งปอด (30)
ปทุมธานี	4	มะเร็งเต้านม (5)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (9)		โรคหัวใจขาดเลือด (37)
พระนครศรีอยุธยา	4	โรคหัวใจขาดเลือด (5)		มะเร็งลำไส้ใหญ่ (17) มะเร็งเต้านม (13)	โรคหลอดเลือดสมอง (26) มะเร็งปอด (37)
ลพบุรี	4		อุบัติเหตุจากรถ (9)	โรคหัวใจขาดเลือด (17) โรคหลอดเลือดสมอง (20)	โรคตับ (28) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (34) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (25) มะเร็งเต้านม (23) ฆ่าตัวตาย (25)
สระบุรี	4		โรคหลอดเลือดสมอง (8) อุบัติเหตุจากรถ (8)	โรคตับ (20) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (15) มะเร็งเต้านม (16)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (29) โรคเบาหวาน (38) โรคหัวใจขาดเลือด (23) มะเร็งปอด (38)
สิงห์บุรี	4	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (4)	มะเร็งเต้านม (6)	โรคหลอดเลือดสมอง (16) มะเร็งปอด (19)	โรคตับ (39) โรคหัวใจขาดเลือด (29) โรคไตวายเรื้อรัง (38) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (27) อุบัติเหตุจากรถ (31) ฆ่าตัวตาย (40)
อ่างทอง	4	โรคหัวใจขาดเลือด (3)	โรคหลอดเลือดสมอง (9)	มะเร็งปอด (18) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (14)	โรคเบาหวาน (36) มะเร็งเต้านม (31) อุบัติเหตุจากรถ (32) จมน้ำ (30)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
เพชรบุรี	5		มะเร็งเต้านม (7)		โรคหัวใจขาดเลือด (36) มะเร็งปอด (32) อุบัติเหตุจากรถ (34)
กาญจนบุรี	5			มะเร็งลำไส้ใหญ่ (11) อุบัติเหตุจากรถ (16)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (24) โรคหัวใจขาดเลือด (31) โรคหลอดเลือดสมอง (39) มะเร็งเต้านม (32) จมน้ำ (37) ฆ่าตัวตาย (31)
นครปฐม	5			มะเร็งลำไส้ใหญ่ (16) มะเร็งเต้านม (12)	โรคเบาหวาน (35) โรคหัวใจขาดเลือด (25) โรคหลอดเลือดสมอง (32)
ประจวบคีรีขันธ์	5			อุบัติเหตุจากรถ (17)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (39) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (29) มะเร็งเต้านม (26)
ราชบุรี	5			โรคหัวใจขาดเลือด (18) มะเร็งปอด (17) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (13)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (31) โรคตับ (37) โรคเบาหวาน (27) โรคหลอดเลือดสมอง (25) มะเร็งเต้านม (24) อุบัติเหตุจากรถ (36)
สมุทรสงคราม	5	มะเร็งเต้านม (3)		โรคหัวใจขาดเลือด (12) มะเร็งปอด (12) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (12) จมน้ำ (12)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (34) โรคเบาหวาน (23) โรคหลอดเลือดสมอง (33)
สมุทรสาคร	5				มะเร็งปอด (26) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (24) มะเร็งเต้านม (25)
สุพรรณบุรี	5	อุบัติเหตุจากรถ (2)	โรคหลอดเลือดสมอง (7) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (10) มะเร็งเต้านม (8)	โรคเบาหวาน (18) โรคหัวใจขาดเลือด (15)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (28) โรคไตวายเรื้อรัง (24) มะเร็งปอด (24) จมน้ำ (23) ฆ่าตัวตาย (36)
จันทบุรี	6	โรคตับ (4) อุบัติเหตุจากรถ (3)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (8) โรคเบาหวาน (10) มะเร็งปอด (10) มะเร็งเต้านม (10) จมน้ำ (10)	โรคหลอดเลือดสมอง (13) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (20) ฆ่าตัวตาย (11)	โรคไตวายเรื้อรัง (28) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (38)
ฉะเชิงเทรา	6			โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (20) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (19) จมน้ำ (16)	โรคเบาหวาน (26) โรคหัวใจขาดเลือด (34) มะเร็งเต้านม (21) อุบัติเหตุจากรถ (24)
ชลบุรี	6				มะเร็งลำไส้ใหญ่ (35) มะเร็งเต้านม (27)
ตราด	6	อุบัติเหตุจากรถ (5)		โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (13) โรคหัวใจขาดเลือด (14) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (18)	โรคตับ (24) โรคเบาหวาน (37) โรคหลอดเลือดสมอง (35) โรคไตวายเรื้อรัง (33) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (36) มะเร็งปอด (28) จมน้ำ (26) ฆ่าตัวตาย (24)
ปราจีนบุรี	6			โรคตับ (14) โรคหลอดเลือดสมอง (19) อุบัติเหตุจากรถ (11) จมน้ำ (11)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (33) โรคไตวายเรื้อรัง (39) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (25) มะเร็งปอด (36) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (23) มะเร็งเต้านม (33)
ระยอง	6			อุบัติเหตุจากรถ (19)	มะเร็งเต้านม (36)
สมุทรปราการ	6		มะเร็งลำไส้ใหญ่ (7)	มะเร็งเต้านม (11)	โรคเบาหวาน (29) โรคหัวใจขาดเลือด (32)
สระแก้ว	6	โรคตับ (1) อุบัติเหตุจากรถ (1) จมน้ำ (1)		มะเร็งตับและท่อน้ำดี (11) ฆ่าตัวตาย (15)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (26) โรคหลอดเลือดสมอง (30) โรคไตวายเรื้อรัง (32) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (37)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
กาฬสินธุ์	7	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (1) โรคเบาหวาน (3) โรคไตวายเรื้อรัง (5) โรคตับ (6)		จมน้ำ (18) ฆ่าตัวตาย (19)	
ขอนแก่น	7			มะเร็งตับและท่อน้ำดี (15) โรคเบาหวาน (17) จมน้ำ (20)	โรคตับ (23) โรคไตวายเรื้อรัง (23) ฆ่าตัวตาย (35)
มหาสารคาม	7	โรคเบาหวาน (1)		มะเร็งตับและท่อน้ำดี (12) โรคไตวายเรื้อรัง (13) จมน้ำ (15)	โรคตับ (22) โรคหลอดเลือดสมอง (37) อุบัติเหตุจราจร (40)
ร้อยเอ็ด	7	โรคเบาหวาน (2) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (6)	จมน้ำ (7)	โรคตับ (11) โรคไตวายเรื้อรัง (14)	โรคหลอดเลือดสมอง (29) มะเร็งปอด (29)
เลย	8		โรคไตวายเรื้อรัง (6)	ฆ่าตัวตาย (12) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (20)	โรคหลอดเลือดสมอง (27) โรคตับ (29) โรคเบาหวาน (30) จมน้ำ (32) มะเร็งปอด (34) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (38)
นครพนม	8	โรคเบาหวาน (5) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (5)		โรคไตวายเรื้อรัง (19)	จมน้ำ (31)
บึงกาฬ	8	จมน้ำ (5)	โรคเบาหวาน (7)		ฆ่าตัวตาย (22) อุบัติเหตุจราจร (25) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (30) โรคไตวายเรื้อรัง (34)
สกลนคร	8	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (4)		โรคเบาหวาน (12) จมน้ำ (17)	โรคไตวายเรื้อรัง (25) ฆ่าตัวตาย (29)
หนองคาย	8			มะเร็งตับและท่อน้ำดี (18)	โรคเบาหวาน (24) มะเร็งปอด (27)
หนองบัวลำภู	8	โรคไตวายเรื้อรัง (5)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (7)		โรคเบาหวาน (22) ฆ่าตัวตาย (26) จมน้ำ (28) มะเร็งปอด (31)
อุดรธานี	8		โรคเบาหวาน (8)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (14)	จมน้ำ (29) ฆ่าตัวตาย (33) โรคไตวายเรื้อรัง (29) โรคตับ (32)
ชัยภูมิ	9		จมน้ำ (6)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (13) โรคเบาหวาน (16) โรคตับ (17) ฆ่าตัวตาย (18)	อุบัติเหตุจราจร (29) โรคไตวายเรื้อรัง (35) โรคหลอดเลือดสมอง (36)
นครราชสีมา	9			จมน้ำ (19) โรคตับ (19)	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (26) โรคหลอดเลือดสมอง (31) อุบัติเหตุจราจร (33) โรคไตวายเรื้อรัง (36) มะเร็งเต้านม (37) ฆ่าตัวตาย (38) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (40) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (40)
บุรีรัมย์	9	โรคตับ (2) จมน้ำ (2)		โรคเบาหวาน (11) โรคหลอดเลือดสมอง (11)	อุบัติเหตุจราจร (27) โรคไตวายเรื้อรัง (30) ฆ่าตัวตาย (37)
สุรินทร์	9	จมน้ำ (3)	โรคตับ (8)		โรคหลอดเลือดสมอง (40)

จังหวัด	เขตสุขภาพ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 1-5 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 6-10 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 11-20 ของประเทศ	สาเหตุการตาย ที่ติดอันดับ 21-40 ของประเทศ
มุกดาหาร	10	โรคไตวายเรื้อรัง (4)		มะเร็งตับและท่อน้ำดี (16) โรคเบาหวาน (20)	จมน้ำ (34)
ยโสธร	10	โรคเบาหวาน (4)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (9) โรคตับ (9) โรคไตวายเรื้อรัง (10)	จมน้ำ (14) โรคหัวใจขาดเลือด (20)	อุบัติเหตุจากรถ (22) โรคหลอดเลือดสมอง (28) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (36)
ศรีสะเกษ	10	จมน้ำ (4)			โรคตับ (21) มะเร็งตับและท่อน้ำดี (21) โรคไตวายเรื้อรัง (37) อุบัติเหตุจากรถ (38) ฆ่าตัวตาย (39)
อำนาจเจริญ	10		มะเร็งตับและท่อน้ำดี (10)	โรคเบาหวาน (13) โรคไตวายเรื้อรัง (15)	โรคตับ (31) จมน้ำ (35) โรคหลอดเลือดสมอง (38)
อุบลราชธานี	10			โรคเบาหวาน (15) โรคไตวายเรื้อรัง (16)	มะเร็งตับและท่อน้ำดี (35)
กระบี่	11				โรคหัวใจขาดเลือด (38)
ชุมพร	11				โรคหัวใจขาดเลือด (21) ฆ่าตัวตาย (21) อุบัติเหตุจากรถ (30) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (35) มะเร็งปอด (35)
นครศรีธรรมราช	11		โรคหัวใจขาดเลือด (9)	ฆ่าตัวตาย (20)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (25)
พังงา	11			โรคหัวใจขาดเลือด (19)	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (27) มะเร็งเต้านม (28) มะเร็งปอด (33) อุบัติเหตุจากรถ (35) โรคไตวายเรื้อรัง (40)
ภูเก็ต	11				มะเร็งลำไส้ใหญ่ (38)
ระนอง	11			โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (14)	โรคหัวใจขาดเลือด (39)
สุราษฎร์ธานี	11				โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (32) ฆ่าตัวตาย (34)
ตรัง	12				โรคหลอดเลือดสมอง (21) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (23) โรคหัวใจขาดเลือด (24) ฆ่าตัวตาย (27) โรคเบาหวาน (28) อุบัติเหตุจากรถ (39)
นราธิวาส	12			โรคเบาหวาน (19)	
ปัตตานี	12		โรคหัวใจขาดเลือด (6) โรคเบาหวาน (9) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (10)	โรคหลอดเลือดสมอง (15)	
พัทลุง	12			ฆ่าตัวตาย (16)	โรคหัวใจขาดเลือด (30) จมน้ำ (38)
ยะลา	12				โรคเบาหวาน (40)
สงขลา	12				โรคหัวใจขาดเลือด (40)
สตูล	12				โรคเบาหวาน (31)
กรุงเทพมหานคร	13	มะเร็งลำไส้ใหญ่ (2) มะเร็งเต้านม (2)		มะเร็งปอด (16)	โรคหัวใจขาดเลือด (33)