


2. ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต

ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต โดยพิจารณาจากภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตและการฆ่าตัวตาย จะพบว่า สุขภาพจิตคนไทยมีแนวโน้มแย่ลงและมีการเข้ารับรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยนอกมากขึ้น จาก 24.6 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2534 เป็น 37.1 ต่อประชากร 1,000 คน ใน พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 5.5) และผู้ป่วยด้วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและโรคลมชักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 5.4)

ภาพที่ 5.5 อัตราการเข้ารับรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกจากภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2546



ที่มา: รายงานผู้ป่วยนอก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


ตารางที่ 5.4 อัตราป่วยด้วยโรคทางจิตต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

โรค	2540	2541	2542	2543	2544
- โรคจิต	440.1	435.3	424.8	451.0	519.6
- โรควิตกกังวล	789.9	822.6	764.7	812.2	776.0
- โรคซึมเศร้า	55.9	74.3	99.5	130.3	94.9
- ภาวะปัญญาอ่อน	44.7	52.9	58.2	52.4	51.7
- โรคลมชัก	109.3	125.8	NA	149.8	182.5

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนการฆ่าตัวตายก็เป็นดัชนีอีกตัวที่จะสะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตขั้นร้ายแรง ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่า หลังวิกฤตเศรษฐกิจการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก โดยอัตราการฆ่าตัวตายของเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงเกือบ 4 เท่า (ภาพที่ 5.6)

ภาพที่ 5.6 อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2546



ที่มา: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ