

จับมือเอาชนะคำทำนาย พลิกชะตาร้ายวัยรุ่นเสียงเฮดส์

สำนักพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกันแก้ปัญหาเอ็ดส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลวิจัยที่จัดทำขึ้นเมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา ว่า ในบรรดากลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเอดส์นั้น มีอยู่ 2 กลุ่มที่แสดงแนวโน้มว่าจะมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างปี 2540-2553 ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ มีสภาพทรงตัว หรือลดลง

นั่นคือ กลุ่มคนที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส และ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

จากการคาดประมาณสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แยกตามกลุ่มประชากร ระหว่างปี 2540-2553 พบว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีสัดส่วนของความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มคนที่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส

เพศสัมพันธ์นอกสมรส ใครคือคนเสี่ยง?

ข้อมูลเกี่ยวเนื่องที่ชวนให้วิตกกังวล ในรายงานฉบับนี้มีข้อสันนิษฐานว่า กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเกือบทั้งหมดน่าจะเป็นเยาวชน โดยความอยากรู้อยากลอง การพัฒนาทางร่างกายและความรู้สึกทางเพศ รวมถึงปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต่างส่งผลให้วัยรุ่นไทยมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกในอายุน้อยลงเรื่อยๆ และมักจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะเข้าใจผิดๆ ว่า การมีเพศสัมพันธ์กับคนรู้จักน่าจะปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเหมือนการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะคนกลุ่มใดจะมาแรง ช่างนำในภาพเปรียบเทียบ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เสี่ยง หรือติดเชื้อเอชไอวีแล้วในกลุ่มอื่น ๆ จะเผชิญปัญหาและความทุกข์ในชีวิตน้อยกว่าแต่อย่างใด

ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2552 สืบค้นได้จาก <http://www.hiso.or.th>