


4. ความชุกของภาวะผิดปกติต่างๆ ปรับด้วยฐานประชากรโลก

การนำข้อมูลอัตราความชุกภาวะผิดปกติต่างๆ ที่พบจากการสำรวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2534 ซึ่งรายงานไว้ในตอนต้นๆ เพื่อแสดงปัญหาสุขภาพของประชาชนไทยนั้น จะต้องคำนึงถึงลักษณะของข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อต้องการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ศึกษาจากฐานประชากรอื่นที่แตกต่างกัน แม้แต่จะเป็นข้อมูลของประชากรไทยเอง แต่หากการศึกษากระทำในปีต่างกัน ก่อนจะนำมาเปรียบเทียบควรจะต้องปรับข้อมูลโดยใช้ฐานประชากรมาตรฐานเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ เพื่อลดอคติอันเนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างประชากร คณะวิจัยจึงได้ปรับอัตราความชุกโดยใช้ฐานประชากรของโลก ดังนี้

4.1 อัตราความชุกของภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันใน 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับโดยฐานประชากรโลก

ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ทั่วประเทศ เพศชายรายงานการเจ็บป่วยเฉียบพลันในระยะ 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจสูงกว่าหญิงเพียงเล็กน้อย คือ ชายร้อยละ 49.8 หญิงร้อยละ 47.4 สูงสุดในกลุ่มเด็กหญิงที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง และเด็กชายในภาคกลาง (ร้อยละ 56.9, 56.8 และ 56.7 ตามลำดับ) รองลงมาคือ เด็กชายในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 53.8) ในกลุ่มเด็กโตอายุ 10-14 ปี เด็กหญิงกลับสูงกว่าเด็กชาย (หญิงร้อยละ 30.2 และชายร้อยละ 29.4) สูงสุดในกลุ่มเด็กหญิงในภาคกลาง (ร้อยละ 38.2) รองลงมาคือเด็กชายในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 37.0) และเด็กชายในภาคเหนือ (ร้อยละ 36.1) สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปนั้น เพศหญิงสูงกว่าชาย 1.3 เท่า สูงสุดในกลุ่มหญิงภาคกลาง (ร้อยละ 54.6) และหญิงในกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 51.2) ดังรูปที่ 56 และตารางที่ 136

รูปที่ 56 อัตรา (ร้อยละ) ของภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



ตารางที่ 136 อัตรา (ร้อยละ) ของภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0-4	50.7	47.3	60.6	67.0	55.8	49.6	57.9	51.8	62.5	64.2
5-9	40.5	37.2	52.1	44.6	44.6	43.8	38.9	35.5	43.2	48.1
10-14	24.8	28.6	35.9	38.2	36.1	29.2	28.0	28.3	37.0	31.1
15-19	23.9	27.0	38.3	42.6	20.7	33.7	25.6	27.5	34.8	34.8
20-24	25.7	33.7	46.3	50.6	26.6	33.7	29.7	35.7	23.5	43.0
25-29	32.9	41.3	37.5	59.0	27.3	42.6	32.8	37.0	46.3	56.2
30-34	30.2	43.2	40.0	48.8	27.6	43.5	38.5	42.3	39.3	55.2
35-39	35.3	47.1	45.1	58.3	38.1	43.1	33.3	37.8	41.8	49.6
40-44	33.2	43.6	45.0	49.4	47.2	46.7	27.9	41.4	40.7	53.1
45-49	34.5	48.6	38.4	51.2	40.3	59.5	40.8	40.5	48.5	52.9
50-54	31.2	52.5	44.2	58.1	39.3	58.7	34.7	46.5	36.8	60.5
55-59	33.8	55.6	49.5	60.5	50.0	59.4	35.1	46.5	40.6	62.9
60-64	40.3	55.2	41.7	64.3	50.0	53.5	35.8	51.0	35.9	56.3
65-69	45.7	54.9	74.4	66.7	44.4	46.7	46.1	49.1	53.6	46.7
70+	48.7	56.0	57.8	68.4	45.7	54.8	35.7	47.5	44.1	59.6
รวม	32.9	43.9	44.4	54.6	35.5	46.0	33.5	40.0	39.4	51.2


4.2 อัตราความชุกของการบาดเจ็บภายใน 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับโดยฐานประชากรโลก

ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี อัตราชุกของการบาดเจ็บในระยะ 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ในระดับประเทศพบว่า เพศชายสูงกว่าหญิง 1.4 เท่า คือ ชายร้อยละ 22.0 หญิงร้อยละ 16.1 สูงสุดในเพศชายที่อาศัยในภาคกลาง (ร้อยละ 30.2) รองลงมาคือ ชายในภาคเหนือ (ร้อยละ 25.6) สำหรับกลุ่มเด็กโตอายุ 10-14 ปี ชายสูงกว่าหญิง 1.6 เท่า สูงที่สุดในเพศชายในภาคเหนือ (ร้อยละ 27.1) รองลงมาคือชายในภาคกลาง ในอัตราร้อยละ 20.2 ส่วนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย สูงที่สุดในเพศหญิงที่อาศัยในภาคกลาง (ร้อยละ 12.3) และชายในภาคเดียวกัน (ร้อยละ 11.7) ดังแสดงในรูปที่ 57 และตารางที่ 137

ตารางที่ 137 อัตรา (ร้อยละ) ของภาวะการบาดเจ็บในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับด้วยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0-4	22.6	14.9	30.6	25.3	25.0	22.6	16.2	14.9	17.9	12.5
5-9	18.2	11.4	33.8	22.1	26.4	16.1	17.9	14.1	16.5	13.7
10-14	17.1	87.8	20.2	18.3	27.1	12.2	16.4	11.0	14.8	14.7
15-19	9.7	5.8	20.0	16.0	14.9	10.1	12.8	6.2	19.6	7.6
20-24	6.5	7.0	18.9	12.2	12.7	6.9	5.4	6.1	7.8	6.4
25-29	11.0	4.8	10.6	9.6	12.5	8.8	6.5	2.6	13.0	4.7
30-34	7.9	4.8	6.9	12.1	6.7	3.8	7.4	4.7	4.9	6.3
35-39	7.4	4.6	8.2	11.7	4.8	11.2	5.3	5.1	9.0	8.7
40-44	6.0	4.6	12.8	7.6	5.6	7.8	2.9	3.4	5.6	8.1
45-49	3.1	5.2	4.0	12.4	9.0	5.4	0.0	3.6	9.1	8.2
50-54	6.4	7.1	5.8	13.7	12.5	7.9	8.2	3.0	0.0	7.0
55-59	0.7	4.5	9.5	15.1	14.3	10.1	3.9	6.1	0.0	4.8
60-64	5.8	6.3	5.0	15.5	6.3	11.6	3.0	4.2	2.6	9.9
65-69	3.2	6.8	20.5	6.7	0.0	3.3	1.5	0.0	0.0	4.4
70+	4.3	7.3	12.5	13.7	11.4	4.8	1.8	6.9	2.9	9.6
รวม	6.6	5.7	11.7	12.3	9.9	7.9	5.6	4.5	7.8	7.1


รูปที่ 57 อัตรา (ร้อยละ) ของภาวะบาดเจ็บในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการสำรวจ ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




4.3 อัตราการสูญบุหรีในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก

ในภาพรวมอัตราการสูญบุหรีในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปเมื่อปรับฐานประชากรแล้วพบว่า เพศชายสูงถึงร้อยละ 60.4 สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 65.6) หญิง ร้อยละ 6.9 สูงสุดในภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 11.0 เท่ากัน) ดังรูปที่ 58 และ 59 ส่วนกลุ่มที่สูญบุหรีเป็นประจำ จะมีอัตราการสูญบุหรีประจำร้อยละ 50.0 ในเพศชาย และ 4.5 ในเพศหญิง โดยที่อัตราการสูญบุหรีเป็นประจำสูงสุดในเพศชายอายุ 45-49 ปี (ร้อยละ 58.7) และต่ำสุดในเพศหญิงอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 0.5) เพศชาย ในภาคใต้สูญบุหรีเป็นประจำสูงกว่าภาคอื่นๆ (ร้อยละ 54.8) รองลงมาคือ เพศชายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 53.9) ดังแสดงในตารางที่ 138

รูปที่ 58 อัตรา (ร้อยละ) การสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและอายุ ทั้งกลุ่มที่สูบบุหรี่ประจำและไม่ประจำ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 59 อัตรา (ร้อยละ) การสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก ทั้งที่สูบบุหรี่ประจำและไม่ประจำ จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




ตารางที่ 138 อัตรา (ร้อยละ) การสูบบุหรี่เป็นประจำในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั่วประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	22.1	0.5	23.5	0.3	17.5	0.6	18.5	0.0	19.9	1.2	41.3	0.0
20-24	50.3	2.1	56.0	0.3	44.2	1.3	42.9	4.6	56.8	1.7	35.3	6.5
25-29	56.3	2.2	60.4	0.6	51.9	3.7	49.2	2.0	63.1	1.6	50.0	5.5
30-34	57.3	3.1	58.1	0.8	53.8	1.9	52.9	6.2	69.6	1.8	44.3	7.7
35-39	57.8	4.1	60.6	1.4	49.2	4.4	50.7	10.5	69.7	1.7	55.2	5.5
40-44	55.7	5.9	65.2	2.1	48.6	4.6	56.1	12.7	55.8	4.8	27.8	6.3
45-49	58.7	5.9	64.6	0.5	57.6	5.8	51.5	7.8	63.2	9.9	39.4	11.8
50-54	57.7	8.3	59.0	2.4	61.6	10.5	60.0	13.2	58.2	10.1	36.8	11.6
55-59	54.0	6.9	61.0	1.3	53.7	5.9	46.7	11.9	58.4	11.4	34.4	6.5
60-64	51.6	8.3	56.0	0.7	48.3	8.3	48.1	11.7	59.7	13.5	35.9	12.7
65-69	46.7	7.4	42.5	5.8	51.3	6.7	48.7	5.0	50.8	9.1	39.3	13.3
70+	42.1	7.5	48.9	4.9	45.3	8.4	32.3	9.9	44.6	5.0	32.4	13.5
รวม	50.0	4.5	53.9	1.4	46.9	4.7	45.3	7.1	54.8	5.0	40.1	7.4


4.4 อัตราการดื่มสุรากลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเมื่อปรับโดยฐานของประชากรโลกแล้ว พบว่า ในภาพรวมชายไทยร้อยละ 62.3 และหญิงร้อยละ 24.7 ดื่มสุราเพศชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดื่มสุราในอัตราสูงที่สุด (ร้อยละ 69.4) ส่วนเพศหญิงในภาคกลาง ภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร ดื่มในอัตราใกล้เคียงกัน ต่ำสุดคือหญิงในภาคใต้เพียงร้อยละ 9.7 เท่านั้นที่รายงานว่าดื่มสุรา (รูปที่ 60 และ 61) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ดื่มเป็นประจำแล้ว อัตราการดื่มสุราลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.4 ในชาย และ 1.7 ในหญิงทั้งชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานครดื่มสุราเป็นประจำสูงที่สุด (ร้อยละ 14.7 และ 3.4 ตามลำดับ) ในกลุ่มผู้ชายอายุ 35-39 ปี มีอัตราการดื่มสุราเป็นประจำสูงที่สุด ถึงร้อยละ 17.6 ส่วนเพศหญิงดื่มในกลุ่มผู้สูงอายุคือ 50-55 ปีและ 60-64 ปี (ร้อยละ 3.2) ดังแสดงในตารางที่ 139

รูปที่ 60 อัตรา (ร้อยละ) การดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก ทั้งกลุ่มที่ดื่มประจำและไม่ประจำ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 61 อัตรา (ร้อยละ) การดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก ทั้งกลุ่มที่ดื่มประจำและไม่ประจำ จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




ตารางที่ 139 อัตรา (ร้อยละ) การดื่มสุราเป็นประจำในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั่วประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	2.8	0.0	3.5	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	2.8	0.0	4.3	0.0
20-24	10.5	0.6	11.6	0.3	8.4	0.0	14.3	1.3	9.9	0.6	2.0	1.1
25-29	11.4	0.6	14.7	0.6	9.6	1.6	9.5	0.5	10.7	0.0	7.4	0.0
30-34	14.9	2.1	11.4	0.3	22.3	4.2	17.4	2.1	11.9	0.6	16.4	5.6
35-39	17.6	2.0	13.3	1.4	21.3	3.9	18.7	0.6	17.4	0.6	25.4	4.7
40-44	14.3	1.9	7.7	1.1	18.3	2.9	14.0	1.5	22.1	1.4	20.4	3.6
45-49	13.3	2.3	9.2	1.4	14.1	1.7	13.9	2.6	19.7	1.8	18.2	5.9
50-54	14.0	3.2	11.0	0.5	20.9	7.3	9.4	3.8	12.2	1.0	26.3	5.8
55-59	14.4	2.7	8.9	1.3	22.1	5.9	12.0	0.9	15.6	1.8	15.6	4.8
60-64	12.2	3.2	10.4	2.1	21.7	6.0	5.2	1.3	10.4	2.1	20.5	5.6
65-69	8.6	2.2	4.1	0.0	15.4	3.3	0.0	1.7	7.7	3.6	25.0	4.4
70+	6.6	2.7	0.0	0.8	4.7	7.4	4.8	1.4	14.3	0.0	17.6	5.8
รวม	11.4	1.7	9.2	0.7	13.9	3.1	10.5	1.3	12.5	0.9	14.7	3.4

4.5 ภาวะโภชนาการ ปรับโดยฐานประชากรโลก

เมื่อปรับผลการสำรวจภาวะโภชนาการโดยใช้ฐานประชากรโลกแล้ว พบว่ากลุ่มที่มีทุพโภชนาการในระดับ 2 หรือ 3 นั้น พบสูงสุดในกลุ่มอายุ 1 ปี ทั้งชายและหญิง (ชายร้อยละ 7.4 หญิงร้อยละ 8.7) ดังรูปที่ 62 เพศชายอายุ 2 ปี ในกรุงเทพมหานคร มีอัตราทุพโภชนาการสูงสุด (ร้อยละ 17.6) ส่วนเพศหญิงอายุ 2 ปีในภาคเหนือมีอัตราสูงสุด (ร้อยละ 18.4) ดังแสดงในตารางที่ 140 สำหรับอัตราทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้ง 3 ระดับในเพศชายสูงสุดในกลุ่มอายุ 3 ปี (ร้อยละ 33.0) ส่วนเพศหญิง สูงที่สุดในกลุ่มอายุ 4 ปี (ร้อยละ 34.0) สูงที่สุดในหญิงอายุ 2 ปีที่อาศัยในภาคเหนือ (ร้อยละ 60.5) รองลงมาคือหญิงอายุ 4 ปีในภาคเหนือ (ร้อยละ 46.5) ส่วนกลุ่มเด็กอายุ 5-19 ปี ในภาพรวมชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย (ชายร้อยละ 14.2 หญิงร้อยละ 13.9) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีอัตราทุพโภชนาการสูงกว่าคนอื่น ดังแสดงในตารางที่ 141

รูปที่ 62 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะทุพโภชนาการระดับ 2 หรือ 3 ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



ตารางที่ 140 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะทุพโภชนาการระดับ 2 หรือ 3 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
1	7.4	8.7	5.1	2.8	11.4	11.6	2.4	8.8	7.5	14.3	13.8	10.3
2	5.0	7.2	3.7	3.5	2.2	8.7	9.8	18.4	1.8	5.4	17.6	5.4
3	4.6	2.8	3.4	1.4	0.0	0.0	5.3	3.3	5.8	5.1	11.1	7.1
4	5.4	3.4	4.9	2.3	6.2	6.7	6.2	2.3	3.9	2.1	8.3	6.7
5	2.4	2.7	0.0	2.7	2.4	2.9	0.0	7.0	4.3	0.0	12.5	0.0

ตารางที่ 141 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะทุพโภชนาการทั้ง 3 ระดับ ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
0	1.8	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
1	22.1	8.7	19.2	14.1	31.4	27.9	19.0	20.6	18.9	28.6	27.8	27.6
2	23.3	7.3	20.7	37.2	17.4	23.9	29.3	60.5	25.9	30.9	29.4	10.8
3	33.0	2.8	39.0	23.2	23.1	20.0	44.7	36.7	28.8	41.0	25.9	14.3
4	22.2	3.4	26.8	29.9	12.5	31.1	21.9	46.5	27.4	37.5	8.3	20.0
5	18.9	2.7	20.0	30.7	14.6	28.6	24.1	20.9	17.4	17.0	18.7	15.4
6-9	17.6	17.8	19.9	19.0	13.9	17.1	18.6	18.9	17.7	17.9	7.8	10.6
10-14	15.6	14.7	16.4	15.2	12.7	12.6	14.8	12.9	19.2	17.4	7.4	11.5
15-19	8.8	8.8	9.0	8.7	6.7	9.2	9.2	8.5	8.5	9.8	13.0	6.1
รวม 6-19	14.2	13.9	15.3	14.5	11.2	13.1	14.3	13.6	15.2	15.1	9.4	9.4


ภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ในภาพรวมทุพโภชนาการในเพศชายสูงกว่าหญิง 1.2 เท่า (ชายร้อยละ 32.4 หญิงร้อยละ 26.1) ภาคเหนือมีภาวะทุพโภชนาการสูงกว่าภาคอื่น และกรุงเทพมหานคร ต่ำกว่าภาคอื่น ดังแสดงในตารางที่ 142

ตารางที่ 142 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะทุพโภชนาการในประชากรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534


อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
20-24	37.7	37.0	37.6	35.7	38.9	36.5	34.3	38.6	40.5	35.7	37.2	41.9
25-29	33.2	26.7	26.7	28.1	39.4	28.2	24.6	28.8	41.0	22.4	50.0	24.2
30-34	28.5	23.8	26.5	29.4	23.1	20.5	37.7	28.5	34.1	19.4	16.4	14.0
35-39	25.2	20.0	24.6	20.9	22.9	16.1	30.7	31.0	25.0	20.3	19.4	7.9
40-44	26.0	16.3	27.0	17.7	22.0	11.8	30.8	20.9	27.9	24.1	16.7	3.6
45-49	28.0	15.9	32.8	20.1	18.2	11.6	36.6	22.4	25.0	13.5	9.1	5.9
50-54	28.3	20.2	30.6	21.9	20.9	13.7	43.5	34.0	23.5	18.2	13.2	10.5
55-59	34.1	25.6	34.1	34.8	37.9	21.8	37.3	31.2	35.1	24.6	12.5	1.6
60-64	35.0	30.3	32.8	40.7	23.3	22.6	46.7	41.6	44.8	26.0	20.5	12.7
65-69	35.2	34.1	32.9	37.9	41.0	35.0	46.1	41.7	35.4	32.7	17.9	15.6
70+	52.8	43.7	52.8	50.0	48.4	41.7	58.1	58.1	55.4	43.5	47.1	23.1
รวม	32.5	26.1	31.8	29.4	30.2	23.3	36.8	32.4	34.8	24.9	25.1	16.1

สำหรับกลุ่มอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เมื่อปรับโดยฐานประชากรโลกแล้ว จะพบ อัตราภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในเพศหญิงสูงกว่าชายถึงเกือบ 2 เท่า (หญิงร้อยละ 25.0 ชายร้อยละ 13.2) สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร (หญิงร้อยละ 35.5 ชายร้อยละ 21.9) ดังแสดงในรูปที่ 63 ภาวะนี้สูงขึ้นตามอายุ และสูงสุดในวัยกลางคน (รูปที่ 64) และเมื่อพิจารณาเพียงภาวะอ้วน จะพบว่า หญิงมีอัตราสูงกว่าชายถึง 3.6 เท่า (หญิงร้อยละ 5.6 ชายร้อยละ 1.5) สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร (หญิงร้อยละ 9.7 ชายร้อยละ 2.0) ดังแสดงในตารางที่ 143

รูปที่ 63 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 64 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนในประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




ตารางที่ 143 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะอ้วนในประชากรอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั่วประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
20-24	0.3	1.8	0.4	1.6	0.0	2.6	0.0	2.0	0.9	1.1	0.0	2.1
25-29	0.3	3.5	0.0	2.9	0.9	3.2	0.8	2.9	0.0	3.1	0.0	7.0
30-34	0.9	4.9	0.4	2.8	2.3	6.0	0.7	5.2	0.7	7.1	1.6	5.6
35-39	2.9	6.1	2.3	4.8	2.5	8.3	2.0	7.0	4.5	2.8	4.5	10.2
40-44	2.6	8.3	2.1	6.4	2.7	8.2	1.9	9.7	2.9	7.6	5.6	12.6
45-49	2.6	8.3	2.6	7.2	4.0	12.4	1.0	4.3	2.6	5.4	3.0	14.1
50-54	2.9	8.3	4.6	5.7	1.2	9.7	0.0	3.8	4.1	12.1	2.6	13.9
55-59	1.7	6.0	1.6	5.7	1.0	6.7	2.7	5.5	2.6	5.3	0.0	8.1
60-64	2.2	6.6	2.4	3.6	3.3	10.7	1.3	2.6	1.5	4.2	2.6	15.5
65-69	1.2	6.5	1.4	0.0	0.0	13.3	0.0	5.0	1.5	7.3	3.6	13.3
70+	0.0	3.8	0.0	0.8	0.0	5.2	0.0	1.4	0.0	4.0	0.0	11.5
รวม	1.5	5.6	1.5	3.9	1.7	7.2	0.9	4.5	1.9	5.1	2.0	9.7


4.6 ภาวะโลหิตจางในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับโดยฐานประชากรโลก (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ในภาพรวม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีผลการตรวจเลือด) อัตราภาวะโลหิตจางในเพศหญิงสูงกว่าชาย คือ หญิงร้อยละ 25.3 ชายร้อยละ 17.8 ภาวะโลหิตจางสูงขึ้นตามอายุ (รูปที่ 65) สูงสุดในภาคใต้ทั้งเพศชายและหญิง (ร้อยละ 26.7 และ 38.1 ตามลำดับ) ดังแสดงในรูปที่ 66 และตารางที่ 144

รูปที่ 65 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะโลหิตจางในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)



รูปที่ 66 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะโลหิตจางในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)




ตารางที่ 144 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะโลหิตจาง ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

อายุ (ปี)	ประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	12.1	16.9	10.0	11.6	6.7	11.6	17.6	27.7	16.3	23.8
20-24	9.8	19.4	8.4	13.5	9.6	9.6	12.4	26.8	16.2	32.4
25-29	11.8	21.3	7.8	13.9	18.1	18.1	16.7	30.7	18.8	27.6
30-34	11.8	21.4	5.1	17.1	14.9	14.9	21.0	26.4	15.6	32.9
35-39	11.8	20.8	7.6	13.0	15.6	15.6	16.0	26.9	20.4	36.2
40-44	14.6	24.3	12.0	19.5	18.8	18.8	17.8	29.1	25.0	35.9
45-49	20.0	26.9	16.9	19.6	15.7	15.7	24.7	31.0	36.8	48.6
50-54	19.5	24.7	17.3	18.6	17.7	17.7	24.7	24.5	25.5	46.4
55-59	20.5	31.4	14.6	25.3	21.0	21.0	24.0	33.0	31.2	49.1
60-64	26.7	38.3	24.0	28.6	28.6	28.6	27.3	45.4	37.3	55.2
65-69	36.6	41.0	24.7	38.8	35.0	35.0	46.1	43.3	53.8	49.1
70+	50.2	45.6	50.6	57.4	27.1	27.1	56.4	38.0	66.1	54.5
รวม	17.8	25.3	14.3	20.2	17.6	17.6	22.6	30.6	26.7	38.1


4.7 ความชุกของเบาหวานในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดพบว่าในภาพรวม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่มีผลตรวจเลือด) ความชุกของเบาหวานในหญิงสูงกว่าชาย (ร้อยละ 2.8 และ 2.0 ตามลำดับ) ดังรูปที่ 67 ภาวะเบาหวานเพิ่มขึ้นตามอายุสูงสุดในกลุ่ม อายุ 55-59 ปี ทั้งชายและหญิง เพศหญิงในภาคกลางมีอัตราความชุกสูงสุด (ร้อยละ 3.3) ส่วนเพศชายสูงสุดในภาคใต้ (ร้อยละ 2.8) ดังรูปที่ 68 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดระดับภาค เพศ และอายุ จะพบความชุกสูงในหลายกลุ่มอายุในภาคกลาง ดังแสดงในตารางที่ 145

รูปที่ 67 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศ และอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)



รูปที่ 68 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะเบาหวานในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)




ตารางที่ 145 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะเบาหวาน ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

อายุ (ปี)	ประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	0.6	0.1	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
20-24	0.8	0.3	0.8	0.3	1.1	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0
25-29	0.7	1.1	0.5	0.9	0.0	2.2	0.0	1.1	2.6	0.6
30-34	1.1	1.5	0.8	0.9	0.8	1.0	0.0	1.7	3.1	3.0
35-39	0.6	1.2	0.0	0.9	0.9	1.7	1.4	1.2	0.8	1.2
40-44	1.8	2.4	2.2	1.5	1.0	4.3	1.9	2.4	2.0	2.1
45-49	3.1	5.0	2.6	5.4	4.0	3.4	2.1	5.4	4.3	5.5
50-54	3.1	5.8	3.1	5.8	6.0	7.8	0.0	7.1	3.3	2.1
55-59	4.8	7.8	7.6	7.8	4.4	12.7	0.0	1.9	5.6	8.3
60-64	4.1	4.4	1.7	2.2	10.2	1.0	2.7	4.0	4.8	10.7
65-69	4.3	6.8	5.6	3.0	2.6	10.9	2.7	10.7	4.7	5.8
70+	4.2	5.5	4.8	7.4	4.8	4.6	4.9	6.4	1.9	3.2
รวม	2.0	2.8	2.0	2.5	2.4	3.3	1.1	2.7	2.5	2.8


4.8 ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก

ในประชากรที่สำรวจอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าเมื่อปรับอัตราชุกของภาวะความดันโลหิตสูงด้วยฐานประชากรโลกแล้ว หญิงมีภาวะความดันโลหิตสูงมากกว่าชายเล็กน้อย (หญิงร้อยละ 5.7 ชายร้อยละ 5.2) สูงที่สุดในภาคกลางทั้งเพศชายและหญิง (รูปที่ 69) ความดันโลหิตสูงมากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะตั้งแต่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ดังแสดงในรูปที่ 70 หญิงในภาคกลางมีอัตราสูงที่สุด คือ ร้อยละ 12.6 รองลงมาคือ ชายในภาคกลาง ร้อยละ 10.8 ต่ำที่สุดในหญิงที่อาศัยในภาคใต้ (ร้อยละ 2.6) และชายในภาคใต้ (ร้อยละ 3.2) ตารางที่ 146

รูปที่ 69 อัตรา (ร้อยละ) ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 70 อัตรา (ร้อยละ) ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลกจำแนกตามเพศ และอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




ตารางที่ 146 อัตรา (ร้อยละ) ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	0.8	0.5	0.3	0.6	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20-24	1.5	0.3	0.8	0.3	6.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
25-29	1.9	1.2	1.4	0.6	4.8	4.8	1.6	0.0	0.0	0.5	3.7	0.8
30-34	2.2	2.9	0.7	2.0	6.1	7.0	0.7	2.1	1.5	0.6	4.9	2.8
35-39	4.2	4.2	2.6	2.2	10.7	13.3	4.7	2.3	1.5	1.1	3.0	3.2
40-44	5.1	4.4	3.0	2.5	7.3	8.8	5.6	3.7	2.9	3.4	13.0	4.5
45-49	8.3	8.9	7.7	6.2	16.2	17.4	5.9	9.5	1.3	3.6	12.1	9.4
50-54	8.1	11.8	5.2	5.2	14.0	25.0	3.5	11.3	9.2	3.0	15.8	19.8
55-59	10.7	11.2	4.1	5.7	16.8	26.0	16.0	8.3	3.9	4.4	21.9	14.5
60-64	8.1	12.6	3.2	8.6	20.0	26.2	6.5	13.0	4.5	7.3	15.4	11.3
65-69	8.2	10.8	6.8	7.8	17.9	20.0	2.6	11.7	6.1	3.6	10.7	13.3
70+	15.7	16.5	10.1	8.2	26.6	34.4	6.4	15.5	19.6	11.9	20.6	13.5
รวม	5.2	5.7	3.2	3.3	10.8	12.6	3.7	5.0	3.2	2.6	8.5	6.1


4.9 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก

ในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป โดยปรับด้วยฐานประชากรโลก พบว่าอัตราการพบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเท่ากันทั้งชายและหญิงคือร้อยละ 1.1 อัตราการพบโรคเพิ่มขึ้นตามอายุ สูงสุดในเพศหญิงอายุ 65-69 ปี (ร้อยละ 4.3) ดังแสดงในรูปที่ 71 ในกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิงพบมีโรคหัวใจตีบตันสูงกว่าภาคอื่น คือ ชายร้อยละ 2.6 หญิงร้อยละ 1.9 (รูปที่ 72)

รูปที่ 71 อัตรา (ร้อยละ) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




รูปที่ 72 อัตรา (ร้อยละ) โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




4.10 ความชุกของภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

เมื่อปรับอัตราความชุกของภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้ประชากรโลกเป็นฐาน (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ไม่มีผลตรวจเลือด) พบว่า หญิงมีอัตราชุกสูงกว่าชายเกือบเท่าตัว คือ ชายร้อยละ 9.3 หญิงร้อยละ 14.2 ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ สูงสุดในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ (รูปที่ 73) หญิงและชายในภาคใต้มีความชุกสูงกว่าภาคอื่นๆ (รูปที่ 74) อัตราชุกเฉพาะอายุและเพศ ของภาคต่างๆ แสดงในตารางที่ 147

รูปที่ 73 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)



รูปที่ 74 อัตรา (ร้อยละ) ของโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)




ตารางที่ 147 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

อายุ (ปี)	ประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	1.8	6.2	0.7	6.2	3.6	5.0	2.7	2.5	1.6	10.3
20-24	4.7	9.1	3.3	8.6	7.5	8.1	3.2	8.6	6.7	11.0
25-29	5.8	9.3	4.9	5.7	7.0	10.6	4.2	6.4	7.9	17.8
30-34	8.1	9.8	3.9	7.6	9.9	12.3	6.8	10.6	16.1	10.3
35-39	13.1	10.1	9.6	7.1	20.7	12.1	10.6	8.5	15.7	15.8
40-44	10.6	11.6	6.9	9.3	17.3	13.6	9.6	7.1	12.9	17.6
45-49	11.2	16.2	7.4	8.8	14.1	18.8	9.3	16.4	20.3	27.0
50-54	15.9	23.9	12.9	15.5	15.7	37.9	7.5	21.2	28.4	28.1
55-59	13.9	26.4	11.8	18.3	17.6	33.0	12.0	21.1	14.9	35.8
60-64	15.1	25.5	14.2	14.9	20.3	30.1	10.7	27.0	17.5	35.5
65-69	13.9	25.1	9.9	20.0	13.5	32.7	13.5	17.9	18.7	34.6
70+	11.8	21.4	5.9	14.9	17.7	31.0	13.1	17.7	12.7	23.2
รวม	9.3	14.1	6.9	10.1	12.5	17.4	7.6	11.9	13.0	19.8


4.11 ความชุกของภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

ในภาพรวมทั้งประเทศ ความชุกของภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (เฉพาะกลุ่มที่น่าจะเป็นและน่าจะเป็นอย่างยิ่ง และยกเว้นกรุงเทพมหานคร เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน) ในเพศชายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย (ชายร้อยละ 1.6 หญิงร้อยละ 1.3) ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ สูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุ (รูปที่ 75) ชายในภาคใต้ (ร้อยละ 2.1) และหญิงในภาคเหนือ (ร้อยละ 1.6) มีอัตราชุกของภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังสูงที่สุด (รูปที่ 76) ความชุกเฉพาะอายุ เพศ และภาค แสดงในตารางที่ 148

รูปที่ 75 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)



รูปที่ 76 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)



ตารางที่ 148 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

อายุ (ปี)	ประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	0.3	0.0	0.7	0.0	ไม่พบ		ไม่พบ		ไม่พบ	
20-24	0.3	0.1	0.4	0.3	ไม่พบ		0.9	0.0	ไม่พบ	
25-29	0.3	0.2	ไม่พบ		0.0	0.5	ไม่พบ		0.0	0.5
30-34	0.3	0.3	0.0	0.3	0.8	0.5	0.7	0.0	ไม่พบ	
35-39	0.1	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.7
40-44	1.1	1.2	0.4	0.7	0.0	1.8	0.9	2.2	2.9	1.4
45-49	1.2	0.9	1.5	1.0	1.0	0.8	0.0	1.7	2.6	0.9
50-54	1.9	1.9	0.6	0.5	0.0	1.6	3.5	5.7	4.1	0.0
55-59	3.0	3.0	0.8	3.2	2.1	1.7	2.7	3.7	7.8	3.5
60-64	4.3	3.4	3.2	4.3	1.7	3.6	1.3	2.6	9.0	3.1
65-69	5.3	4.6	1.4	3.9	5.1	1.7	7.7	5.0	7.7	5.4
70+	7.9	5.0	10.2	8.2	6.2	6.3	11.3	2.8	0.0	3.0
รวม	1.6	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.7	1.6	2.1	1.2

4.12 ภาวะลมชักในประชากรอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป (เฉพาะประวัติการชัก ระยะ 2 ปีก่อนการสำรวจ) เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก

เมื่อปรับอัตราภาวะลมชัก (เฉพาะที่ให้ประวัติการชักในระยะ 2 ปีก่อนการสำรวจ) โดยใช้โครงสร้างประชากรโลก พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เพศชายและเพศหญิงให้ประวัติการชักในอัตราใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 0.6 และ 0.5 ตามลำดับ ประวัติการชักสูงในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 15 ปีในทุกภาคสูงสุดในภาคกลางทั้งเพศชายและหญิง ดังแสดงในตารางที่ 149

ตารางที่ 149 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะลมชักในระยะ 2 ปีก่อนการสำรวจ ในประชากรอายุ 5 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
5-9	1.4	0.8	1.4	0.0	2.8	1.2	0.9	0.9	0.7	1.6	1.5	0.0
10-14	1.1	0.8	1.4	0.9	1.3	0.0	2.0	1.4	0.0	1.0	ไม่พบ	
15-19	0.1	0.7	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	1.5	0.7	0.6	ไม่พบ	
20-24	0.5	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	1.9	0.6	0.0	1.1	ไม่พบ	
25-29	0.2	0.7	0.0	0.3	0.0	1.6	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6
30-34	0.5	0.5	0.4	0.0	1.5	0.5	0.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.7
35-39	0.4	0.2	0.0	0.0	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.0
40-44	0.2	0.6	0.4	0.3	0.0	1.2	0.0	0.7	ไม่พบ		0.0	0.9
45-49	0.4	0.3	0.5	0.5	1.0	0.0	ไม่พบ		ไม่พบ		0.0	1.2
50-54	0.4	0.0	0.6	0.0	ไม่พบ		1.2	0.0	ไม่พบ		ไม่พบ	
55-59	0.7	0.4	1.6	0.0	1.0	0.8	0.0	0.9	ไม่พบ		ไม่พบ	
60-64	1.1	0.4	1.6	0.0	0.0	2.4	1.3	0.0	ไม่พบ		2.6	0.0
65-69	0.4	0.0	ไม่พบ		2.6	0.0	ไม่พบ		ไม่พบ		ไม่พบ	
70+	0.3	1.1	0.0	0.8	0.0	3.3	0.0	1.4	1.8	0.0	ไม่พบ	
รวม	0.6	0.5	0.6	0.3	1.0	0.8	0.7	0.8	0.2	0.5	0.4	0.3


4.13 ความชุกของอาการปวดข้อ ปวดหลังเรื้อรังในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก

ภาพรวมในประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เมื่อปรับฐานประชากรด้วยโครงสร้างประชากรโลกแล้ว พบว่า อัตราการพบอาการปวดข้อเรื้อรัง (ปวดๆ หายๆ เกิน 6 สัปดาห์ขึ้นไป) ในเพศหญิงร้อยละ 4.6 ชายร้อยละ 3.8 การปวดเพิ่มขึ้นตามอายุ (รูปที่ 77) เปรียบเทียบรายภาคพบว่า เพศชายสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 42.6) และหญิงสูงสุดในภาคกลาง (ร้อยละ 53.5) ดังแสดงในรูปที่ 78 อัตราความชุกเฉพาะอายุ เพศ และภาคแสดงในตารางที่ 150


ตารางที่ 150 อัตรา (ร้อยละ) ของอาการปวดข้อเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	22.1	22.5	27.0	24.5	28.3	30.1	19.3	30.0	8.5	9.1	23.9	12.1
20-24	26.8	29.3	29.6	30.7	34.7	39.7	28.6	34.6	16.2	18.4	17.7	19.3
25-29	28.6	31.5	33.6	33.3	28.8	38.8	27.0	33.7	18.8	19.8	33.3	29.7
30-34	31.0	42.0	32.0	47.9	42.3	52.6	30.4	38.9	23.7	22.3	19.7	39.2
35-39	34.0	43.0	39.8	48.2	36.9	42.8	29.3	40.3	28.0	32.8	28.4	46.5
40-44	40.7	53.3	48.1	55.0	37.6	65.3	47.7	61.3	29.8	33.8	22.2	46.8
45-49	47.8	57.2	53.3	59.3	53.5	65.3	51.5	61.2	25.0	46.8	39.4	48.2
50-54	50.2	63.4	53.8	69.0	50.0	67.7	58.8	65.1	40.8	53.5	39.5	52.3
55-59	52.0	62.3	57.7	69.0	49.5	70.6	61.3	62.4	41.6	48.2	40.6	54.8
60-64	51.9	64.5	56.8	63.6	55.0	76.2	49.3	63.6	43.3	57.3	51.3	63.4
65-69	52.5	69.4	60.3	67.0	48.7	81.7	66.7	75.0	38.5	60.0	50.0	62.2
70+	55.7	64.9	60.7	70.5	56.2	66.7	61.3	77.5	44.6	54.5	50.0	51.9
รวม	37.8	45.7	42.6	48.6	40.9	53.5	39.9	49.1	26.5	33.2	31.8	39.3

รูปที่ 77 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปวดข้อเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศ และอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




รูปที่ 78 อัตรา (ร้อยละ) อาการปวดข้อเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534




สำหรับอาการปวดหลังเรื้อรัง (เกินกว่า 6 สัปดาห์) เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลกแล้ว พบว่า หญิงกับชายมีอัตราใกล้เคียงกัน คือ หญิงร้อยละ 42.2 ชายร้อยละ 42.4 อาการนี้เพิ่มขึ้นตามอายุ (รูปที่ 79) ภาคกลางมีอัตราสูงกว่าภาคอื่นๆ และภาคใต้ต่ำกว่าภาคอื่นๆ (รูปที่ 80) อัตราเฉพาะอายุ เพศ และภาค แสดงในตารางที่ 151

รูปที่ 79 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปวดหลังเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและอายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 80 อัตรา (ร้อยละ) ภาวะปวดหลังเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามเพศและภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



ตารางที่ 151 อัตรา (ร้อยละ) ของอาการปวดหลังเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปรับโดยฐานประชากรโลก
จำแนกตามเพศ อายุ การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั้งประเทศ		ตะวันออกเฉียงเหนือ		กลาง		เหนือ		ใต้		กรุงเทพมหานคร	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
15-19	16.8	17.6	21.1	16.1	17.5	22.0	18.5	24.6	6.4	6.7	15.2	15.2
20-24	31.7	31.7	31.6	27.9	40.0	41.0	37.1	39.2	21.6	23.5	27.4	27.4
25-29	43.5	39.3	44.2	31.6	60.6	53.2	46.8	45.8	27.0	34.4	37.0	37.0
30-34	41.4	43.5	37.9	38.9	56.9	54.9	44.2	45.1	34.8	32.3	32.8	32.8
35-39	49.0	47.0	55.7	47.6	59.8	62.8	42.7	44.4	35.6	32.2	43.3	43.3
40-44	50.2	48.6	57.1	47.5	58.7	61.2	54.2	50.0	29.8	32.4	35.2	35.2
45-49	52.2	49.1	49.7	45.0	58.6	59.5	61.4	52.6	38.2	37.8	51.5	51.5
50-54	50.6	53.3	46.8	52.9	58.1	58.9	62.4	61.3	45.9	46.5	36.8	36.8
55-59	50.5	50.7	57.7	50.0	51.6	63.9	52.0	56.0	41.6	37.7	37.5	37.5
60-64	49.5	52.6	51.2	46.4	60.0	67.9	54.5	59.7	37.3	44.8	38.5	38.5
65-69	53.7	52.6	54.7	48.5	59.0	65.0	71.8	58.3	47.7	45.4	32.1	32.1
70+	50.2	54.7	56.2	50.0	60.9	63.5	53.2	66.2	33.9	43.6	35.3	35.3
รวม	42.4	42.2	44.3	39.0	51.1	52.9	46.6	47.3	30.4	32.0	34.1	34.1

4.14 อาการผิดปกติในวัยวะสืบพันธุ์หญิงอายุ 30 ปี ขึ้นไป เมื่อปรับด้วย ฐานประชากรโลก


ในการถามประวัติอาการผิดปกติของช่องคลอดหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่อปรับ
โดยใช้ฐานประชากรโลก พบว่า โดยรวมมีอัตราความผิดปกติร้อยละ 13.8 สูงในกลุ่ม
อายุน้อย และลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ภาคกลางมีอัตราความผิดปกติสูงสุดคือร้อยละ 18.5
ต่ำสุดในภาคใต้ (ร้อยละ 9.6) สำหรับการตรวจเต้านมในหญิงกลุ่มเดียวกันนี้ อัตรา
ความผิดปกติของเต้านมที่ตรวจพบ ซึ่งปรับโดยฐานประชากรโลกคือ ร้อยละ 1.6 สูง
ที่สุดในภาคกลาง (ร้อยละ 2.4) ต่ำสุดในกรุงเทพมหานคร คือร้อยละ 0.8 ดังแสดงใน
ตารางที่ 152 เมื่อเปรียบเทียบความผิดปกติของเต้านมในกลุ่มโสดและที่สมรส พบว่า
กลุ่มโสดมีอัตราความผิดปกติสูงกว่ากลุ่มที่สมรส โดยเฉพาะในหญิงอายุน้อยกว่า 50 ปี
(รูปที่ 81) และภาคกลางในกลุ่มโสดมีอัตราความผิดปกติสูงที่สุด (รูปที่ 82)

ตารางที่ 152 อัตรา (ร้อยละ) ของอาการผิดปกติในช่องคลอด และการตรวจพบความผิดปกติในเต้านมหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามอายุ และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

อายุ (ปี)	ทั่วประเทศ VAG	ทั่วประเทศ เต้านม	ตะวันออกเฉียงเหนือ VAG	ตะวันออกเฉียงเหนือ เต้านม	กลาง VAG	กลาง เต้านม	เหนือ VAG	เหนือ เต้านม	ใต้ VAG	ใต้ เต้านม	กรุงเทพมหานคร VAG	กรุงเทพมหานคร เต้านม
30-34	17.7	1.9	16.0	2.0	20.9	1.9	19.2	1.0	18.2	1.2	14.7	3.5
35-39	17.7	1.8	17.5	2.0	17.8	1.7	25.1	1.2	11.9	2.9	16.5	0.8
40-44	16.3	1.9	13.8	3.2	21.2	0.6	20.9	1.5	12.4	2.8	14.4	0.0
45-49	17.4	1.5	18.2	1.5	24.8	2.5	17.2	2.6	11.7	0.9	12.9	0.0
50-54	13.3	0.8	14.8	0.0	14.5	1.6	13.2	0.0	9.1	1.0	12.8	2.3
55-59	11.7	1.1	12.7	1.3	20.2	2.5	13.8	0.9	4.4	0.0	3.2	0.0
60-64	9.4	1.3	9.3	1.4	14.3	3.6	10.4	0.0	5.2	1.0	8.4	0.0
65-69	7.1	1.5	10.7	1.9	16.7	5.0	1.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
70+	4.5	2.0	1.6	0.8	11.5	4.2	5.6	1.5	2.0	3.0	1.9	0.0
รวม	13.8	1.6	13.5	1.6	18.5	2.4	15.6	1.1	9.6	1.5	10.7	0.8

หมายเหตุ VAG = ความผิดปกติของช่องคลอด ในเรื่องอาการตกขาว เลือดออกผิดปกติ

รูปที่ 81 อัตรา (ร้อยละ) ความผิดปกติในเต้านมหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามอายุและสถานะภาพสมรส การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534



รูปที่ 82 อัตรา (ร้อยละ) ความผิดปกติในเต้านมหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป เมื่อปรับด้วยฐานประชากรโลก จำแนกตามสถานะภาพสมรส และภาค การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พ.ศ. 2534

