


ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ครองแชมป์ !**

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน ในประชากร และ
% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน
ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

0.00% 50.00%

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ปี 2564
สำนักสถิติแห่งชาติ

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร (เฉพาะผู้ขับขี่) ปี 2565




% ดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บ (ผู้ขับขี่)

0.00 35.00

ที่มา: การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ปี 2565
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ผู้ขับขี่) จำแนกเขต ปี 2565

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บ (รวมเสียชีวิต) เฉพาะผู้ขับขี่ จำแนกเขตสุขภาพ




เขตสุขภาพที่ 1 มีสัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ผู้ขับขี่)
สูงสุด (27.09%) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 9 (25.56%) และ เขตสุขภาพที่ 10 (24.44%)
ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร

ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการตายจากโรคตับ

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน ในประชากร และ อัตราตายจากโรคตับ ต่อแสนประชากร (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย)

% การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือน
ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

0.00% 50.00%

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ปี 2564
สำนักสถิติแห่งชาติ

อัตราตายจากโรคตับ รายจังหวัด
(คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2566




อัตราต่อ 100,000 ประชากร

4.17 33.02

ที่มา:ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ปี 2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อัตราตายจากโรคตับ ต่อแสนประชากร (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) จำแนกเขต ปี 2566




เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราตายจากโรคตับ สูงสุด (25.62 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 7 (23.06 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 2 (23.04 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร

ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

การฆ่าตัวตาย ความเปราะบางของสังคม

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ สูงสุดในภาคเหนือ

อัตราการฆ่าตัวตาย ต่อประชากรแสนคน
(คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2566




อัตราต่อ 100,000 ประชากร

1.72 24.00


ที่มา:ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ปี 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

เพศชาย มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ สูงกว่าเพศหญิง ในทุกกลุ่มอายุ โดยเพศชาย มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดใน อายุ 30-44 ปี ใกล้เคียงกับอายุ 60 ปีขึ้นไป และอายุ 45-59 ปี แต่ในเพศหญิง มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดใน อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ โรคทางกาย โรคจิตเวช และการใช้แอลกอฮอล์ และมีปัญหาความสัมพันธ์ รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยกระตุ้น




อัตราการฆ่าตัวตาย ต่อประชากรแสนคน
จำแนกตามเพศและอายุ ปี 2566




ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยกระตุ้น ของการฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 2565

สัดส่วนการฆ่าตัวตายสำเร็จ (%) จำแนกปัจจัยเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565



สัดส่วนการฆ่าตัวตายสำเร็จ (%) จำแนกปัจจัยกระตุ้น ปีงบประมาณ 2565



ที่มา: รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย ปี 2565 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า สัมพันธ์กับ โรคพิษสุรา ?

อันดับที่ของ อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า และ

อัตราผู้ป่วยใน โรคพิษสุรา (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย)

อันดับที่ของ อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า
รายจังหวัด (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) ปี 2565




อันดับที่ของประเทศ

1 77

ที่มา: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน จากระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพโรค

อันดับที่ของ อัตราผู้ป่วยใน โรคพิษสุรา
รายจังหวัด (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) ปี 2565




อันดับที่ของประเทศ

1 77

หมายเหตุ: คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย และนับจำนวนครั้งตามวินิจฉัยโรคหลัก (PRINCIPAL DIAGNOSIS)

อัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า ต่อแสนประชากร (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) จำแนกเขต ปี 2565



เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราผู้ป่วยใน โรคซึมเศร้า สูงสุด (42.5 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 1 (37.5 ต่อแสนประชากร) และ เขตสุขภาพที่ 10 (35.4 ต่อแสนประชากร) ตามลำดับ ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผู้ป่วยใน โรคพิษสุรา


ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

การสูบบุหรี่ กับ อัตราผู้ป่วยในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

อันดับที่ของ อัตราการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน และ

อัตราผู้ป่วยใน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย)

อันดับที่ของ อัตราการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2564




อันดับที่ของประเทศ

1 77

ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ปี 2564
สำนักสถิติแห่งชาติ

อันดับที่ของ อัตราผู้ป่วยใน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) ปี 2565




อันดับที่ของประเทศ

1 77

ที่มา: ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน จากระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2565 โครงการพัฒนาดัชนีภาระโรค

อัตราผู้ป่วยใน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ต่อแสนประชากร (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) จำแนกเขต ปี 2565



เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตราผู้ป่วยใน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง สูงสุด รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 ตามลำดับ อัตราผู้ป่วยใน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในภาคเหนือยังสูง ถึงแม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ลดลงมากแล้ว อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ในอดีต และปัญหา PM2.5 ในภาคเหนือ


ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

อัตราตายมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม

ความเหมือนของ อัตราตาย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ

อัตราตาย โรคมะเร็งเต้านม (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย)

อันดับที่ของ อัตราตาย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
รายจังหวัด (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2566




อันดับที่ของประเทศ

1 77

ที่มา:ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ปี 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อันดับที่ของ อัตราตาย โรคมะเร็งเต้านม
รายจังหวัด (คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2566




อันดับที่ของประเทศ

1 77

ที่มา:ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ปี 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อัตราตาย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ต่อแสนประชากร (คิดตามที่อยู่ผู้ป่วย) จำแนกเขต ปี 2566



เขตสุขภาพที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราตาย โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ สูงสุด รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 4 และ เขตสุขภาพที่ 3 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ โรคมะเร็งเต้านม โดยจังหวัดที่อัตราตายสูงจะอยู่ที่ภาคกลาง และภาคเหนือ


ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตามสถานที่เสียชีวิต)

ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน รายจังหวัด ปี 2566


อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
รายจังหวัด ตามสถานที่เสียชีวิต ปี 2566



อัตราตายต่อแสนประชากร

15.00 50.00

อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เรียงจังหวัด ตามสถานที่เสียชีวิต ปี 2566




ที่มา: ข้อมูลบูรณาการ การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน (มรณบัตร ตำรวจ ประกัน)

ปี 2566 (คิดตามจังหวัดที่เสียชีวิต)


จำนวนเสียชีวิตในจังหวัด x 100,000 / จำนวนประชากรของจังหวัด

พิกัดสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รายจังหวัด ปี 2566


จังหวัดชลบุรี



จังหวัดภูเก็ต



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย (HISO.OR.TH)


การจมน้ำตาย ภัยร้ายใกล้ตัว

อัตราการจมน้ำตาย สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตราการจมน้ำตาย ต่อประชากรแสนคน
(คิดตามที่อยู่ผู้ตาย) ปี 2566




แนวโน้มอัตราการจมน้ำตาย
ต่อประชากรแสนคน ปี 2561-2566



ที่มา:ฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) ปี 2566
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการจมน้ำตาย ต่อประชากรแสนคน จำแนกตามเพศและอายุ ปี 2566



เพศชาย มีอัตราการจมน้ำตาย สูงกว่าเพศหญิง ในทุกกลุ่มอายุ โดยเพศชาย มีอัตราการจมน้ำตายสูงสุดใน อายุ 60 ปีขึ้นไป ใกล้เคียงกับอายุ 45-59 ปี รองลงมาคืออายุ 5-14 ปี แต่ในเพศหญิง มีอัตราการจมน้ำตายสูงสุดในอายุ 0-4 ปี รองลงมาคืออายุ 60 ปีขึ้นไป


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอัตราการจมน้ำตายสูงสุด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดส่วนใหญ่ไม่ใช่จังหวัดที่ติดทะเล จึงน่าจะเป็นการจมน้ำตาย ตามแหล่งน้ำผิวดิน ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัย

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อวัน

รายจุดตรวจวัด เฉลี่ยรายเดือน ปี 2567

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนมกราคม ปี 2567




ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567




ที่มา: ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ ([HTTPS://AIR4THAI.PCD.GO.TH](https://air4thai.pcd.go.th)) ปี 2567 กรมควบคุมมลพิษ

ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร ปี 2567



ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2567



จุดตรวจในกรุงเทพมหานคร มีค่า PM2.5 สูงสุดในเดือนมกราคม เช่นเดียวกับหลายจุดในภาคกลาง เช่น จังหวัดกาญจนบุรี มีค่า PM2.5 สูงถึง 4 เดือน ตั้งแต่มกราคม ถึง เมษายน


ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย ([HISO.OR.TH](https://hiso.or.th))

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อวัน

รายจุดตรวจวัด เฉลี่ยรายเดือน ปี 2567

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนมีนาคม ปี 2567




ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนเมษายน ปี 2567




ที่มา: ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ ([HTTPS://AIR4THAI.PCD.GO.TH](https://air4thai.pcd.go.th)) ปี 2567 กรมควบคุมมลพิษ

ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567



ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ สนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร ปี 2567




จุดตรวจในภาคเหนือ มีค่า PM2.5 สูงสุดในเดือนเมษายน โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วลดลงในเดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายน

ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย ([HISO.OR.TH](https://hiso.or.th))


ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ต่อวัน
รายจุดตรวจวัด เฉลี่ยรายเดือน ปี 2567

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนพฤศจิกายน ปี 2567




ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
รายจุดตรวจวัด เดือนธันวาคม ปี 2567




ที่มา: ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศ ([HTTPS://AIR4THAI.PCD.GO.TH](https://air4thai.pcd.go.th)) ปี 2567 กรมควบคุมมลพิษ

ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปี 2567



ค่าเฉลี่ย PM2.5 รายเดือน ณ จุดตรวจ สถานีตำรวจตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ปี 2567




จุดตรวจในภาคกลาง มีค่า PM2.5 เริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม ถึง มกราคม โดยบางพื้นที่ มีค่า PM2.5 ที่ค่อนข้างสูง เกือบตลอดทั้งปี

ที่มา: ระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพคนไทย ([HISO.OR.TH](https://hiso.or.th))

คุณภาพน้ำผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI)


ระดับคุณภาพน้ำผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ำ
(Water Quality Index, WQI) รายจุดตรวจวัด ปี 2567

คุณภาพน้ำผิวดิน ตามดัชนีคุณภาพน้ำ
รายจุดตรวจวัด ตามแหล่งน้ำ ปี 2567




จำนวนและสัดส่วนจุดตรวจวัด
ตามระดับคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567

จำนวนจุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567




% จุดตรวจวัด จำแนกตามคุณภาพน้ำ (WQI) ปี 2567




ที่มา:ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
ปี 2567 ([HTTPS://RWATER.NMRE.GO.TH](https://rwater.nmre.go.th))


แม่น้ำปิง




แม่น้ำวัง




แม่น้ำยม




แม่น้ำน่าน




แม่น้ำป่าสัก




แม่น้ำชี




แม่น้ำมูล



แม่น้ำท่าจีน



แม่น้ำแม่กลอง



แม่น้ำแควน้อย

