


สถานการณ์การฆ่าตัวตาย

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การฆ่าตัวตาย ในรอบ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 พบว่า อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย เพิ่มขึ้นในบางกลุ่มอายุ เช่น อายุ 40-44 ปี (จาก 8 เป็น 12.6 ต่อแสนประชากร) และอายุ 60-64 ปี (จาก 7.6 เพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ต่อแสนประชากร) เป็นต้น ในขณะที่บางกลุ่มอายุเริ่มมีอัตราตายจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในปี 2560-2562 เช่น อายุ 20-24 ปี (ภาพที่ 80) ทั้งนี้อัตราตายในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในอายุ 35-39 ปี รองลงมาคืออายุ 30-34 ปี และ 40-44 ปี ตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ในผู้สูงอายุ มีอัตราที่ค่อนข้างสูง (11 ต่อแสนประชากร ในอายุ 60-64 ปี และ 65 ปีขึ้นไป) (ภาพที่ 81)


ภาพที่ 80 แนวโน้มอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย อายุ 10-14 ปี, 15-19 ปี, 20-24 ปี, 40-44 ปี, 60-64 ปี ปี พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข




ภาพที่ 81 อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายอายุ ปี พ.ศ. 2562

ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



เมื่อพิจารณาจำนวนการตายจากการฆ่าตัวตาย จำแนกตามเพศ จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในทุกกลุ่มอายุ โดยแตกต่างกันประมาณ 3-8 เท่า (ภาพที่ 82)


ภาพที่ 82 จำนวนตายจากการฆ่าตัวตาย จำแนกตามเพศ รายอายุ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หากเปรียบเทียบอัตราตายจากการฆ่าตัวตายระหว่างภาค จะพบว่า ภาคเหนือ มีอัตราตายสูงที่สุด และห่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจน (14 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2562) รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมีอัตราตายใกล้เคียงกัน (8 ถึง 8.9 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2562) โดยที่กรุงเทพมหานคร มีอัตราตายจากการฆ่าตัวตายต่ำสุด (2.8 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2562) ทั้งนี้แนวโน้มของอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในปี พ.ศ. 2561-2562 (ภาพที่ 83)


ภาพที่ 83 แนวโน้มอัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายภาค ปี พ.ศ. 2553-2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

เมื่อเปรียบเทียบตามเขตสุขภาพ จะพบว่าอัตราการตายจากการฆ่าตัวตายในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในเขต 1 (เชียงใหม่) (16.5 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขต 2 (พิษณุโลก) (13.3 ต่อแสนประชากร) ในขณะที่เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราการตายต่ำสุด (2.8 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 84) และหากเปรียบเทียบอัตราการตายระหว่างจังหวัด พบว่า ลำพูน มีอัตราการตายสูงสุด รองลงมาคือ แม่ฮ่องสอน น่าน และแพร่ ตามลำดับ (ภาพที่ 85)

ภาพที่ 84 อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: จำนวนจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

ภาพที่ 85 แผนที่อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 และจังหวัดที่มีอัตราการตายสูงสุด 10 อันดับแรก

การฆ่าตัวตาย		
จังหวัด	เขตสุขภาพ	อัตราต่อแสนประชากร
ลำพูน	1	22.10
แม่ฮ่องสอน	1	20.40
น่าน	1	19.29
แพร่	1	17.16
พะเยา	1	16.33
ตาก	2	16.23
เชียงใหม่	1	16.15
พัทลุง	12	15.82
เลย	8	14.87
ลำปาง	1	14.77

ที่มา: เหมือนภาพที่ 84

