


สถานการณ์การถูกทำร้ายตาย

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การถูกทำร้ายตาย ในรอบ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 พบว่าอัตราตายจากการถูกทำร้าย มีแนวโน้มที่ลดลงในทุกกลุ่มอายุ เช่น อายุ 20-24 ปี (จาก 8.4 ลดเหลือ 1.9 ต่อแสนประชากร) อายุ 60-64 ปี (จาก 3.4 ลดเหลือ 1.5 ต่อแสนประชากร) เป็นต้น (ภาพที่ 86) ทั้งนี้อัตราตายในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในอายุ 30-34 ปี รองลงมาคืออายุ 35-39 ปี และ 40-44 ปี ตามลำดับ (ภาพที่ 87)


ภาพที่ 86 แนวโน้มอัตราตายจากการถูกทำร้าย อายุ 15-19 ปี, 20-24 ปี, 40-44 ปี, 50-54 ปี, 60-64 ปี ปี พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข




ภาพที่ 87 อัตราตายจากการถูกทำร้าย รายอายุ ปี พ.ศ. 2562

ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



เมื่อพิจารณาจำนวนการตายจากการถูกทำร้าย จำแนกตามเพศ จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในทุกกลุ่มอายุ โดยแตกต่างกันประมาณ 2.5-20 เท่า (อายุ 20-24 ปี ต่างกัน 20 เท่า) (ภาพที่ 88)


ภาพที่ 88 จำนวนตายจากการถูกทำร้าย จำแนกตามเพศ รายอายุ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข

หากเปรียบเทียบอัตราตายจากการถูกทำร้ายระหว่างภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราตายสูงที่สุด โดยแตกต่างจากภาคอื่นอย่างชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 16 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2553 เหลือ 4.1 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2562 หรือลดลง 4 เท่า และภาคอื่นๆ ก็มีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกัน (ภาพที่ 89)


ภาพที่ 89 แนวโน้มอัตราตายจากการถูกทำร้าย รายภาค ปี พ.ศ. 2553-2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

เมื่อเปรียบเทียบตามเขตสุขภาพ จะพบว่าอัตราการตายจากการถูกทำร้ายในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในเขต 12 (สงขลา) (5.2 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือเขต 11 (สุราษฎร์ธานี) (2.9 ต่อแสนประชากร) ในขณะที่เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราการตายต่ำสุด (0.6 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 90) และหากเปรียบเทียบอัตราการตายระหว่าง จังหวัด พบว่า ยะลา มีอัตราการตายสูงสุด รองลงมาคือ พัทลุง ตรัง และนราธิวาส ตามลำดับ (ภาพที่ 91)

ภาพที่ 90 อัตราตายจาก
การถูกทำร้าย รายเขต
สุขภาพ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูล
การตาย (มรณบัตร) และ
จำนวนประชากร (ตัวหาร)
จากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

ภาพที่ 91 แผนที่อัตราตายจากการถูกทำร้าย รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 และจังหวัดที่มีอัตราการตายสูงสุด 10 อันดับแรก

การถูกทำร้ายตาย		
จังหวัด	เขตสุขภาพ	อัตราต่อแสนประชากร
ยะลา	12	6.94
พัทลุง	12	6.48
ตรัง	12	6.08
นราธิวาส	12	5.85
ปัตตานี	12	5.56
ชุมพร	11	4.74
สงขลา	12	3.72
นครศรีธรรมราช	11	3.14
สุราษฎร์ธานี	11	3.12
สตูล	12	2.79

ที่มา: เหมือนภาพที่ 90

