


สถานการณ์การจมน้ำตาย


จากการวิเคราะห์สถานการณ์การจมน้ำตาย ในรอบ 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 พบว่า อัตราตายจากการจมน้ำ มีแนวโน้มที่ลดลงในกลุ่มอายุโดยส่วนใหญ่ เช่น อายุ 5-9 ปี (จาก 12 ลดเหลือ 5.8 ต่อแสนประชากร) และอายุ 10-14 ปี (จาก 5.4 ลดเหลือ 3.7 ต่อแสนประชากร) เป็นต้น ในขณะที่บางกลุ่มอายุ ยังมีอัตราตายที่ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น อายุ 40-44 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แนวโน้มในแต่ละกลุ่มอายุไม่ลดลง และมีบางกลุ่มอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560-2561 และเริ่มลดลงในปี 2562 (ภาพที่ 73) ทั้งนี้อัตราตายในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในอายุ 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคืออายุ 50-54 ปี และ 60-64 ปี ตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราตายจากการจมน้ำ ในผู้สูงอายุ และวัยกลางคน เริ่มสูงกว่าในเด็ก (ภาพที่ 74)

ภาพที่ 73 แนวโน้มอัตราตายจากการจมน้ำ อายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี, 10-14 ปี, 40-44 ปี, 60-64 ปี พ.ศ. 2553-2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข


ภาพที่ 74 อัตราตายจากการจมน้ำ รายอายุ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) และจำนวนประชากร (ตัวหาร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อพิจารณาจำนวนการตายจากการจมน้ำ จำแนกตามเพศ จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ในทุกกลุ่มอายุ โดยแตกต่างกันประมาณ 2-12 เท่า (ภาพที่ 75)


ภาพที่ 75 จำนวนตายจากการจมน้ำ จำแนกตามเพศ รายอายุ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้การตายจากการจมน้ำสูงสุดในช่วงฤดูร้อน (เดือนเมษายน) และฤดูฝน (เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม) และมีอัตราที่ต่ำลงในช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม ถึง มกราคม) หากเปรียบเทียบจำนวนตายในเดือนที่มีผู้เสียชีวิตต่ำสุดกับจำนวนตายในเดือนที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด จะพบว่าต่างกันเกือบ 2 เท่า ในแต่ละปี (ภาพที่ 76)


ภาพที่ 76 จำนวนตายจากการจมน้ำ รายเดือน ปี พ.ศ. 2553, 2555, 2557, 2559, 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูลการตาย (มรณบัตร) จากกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข

หากเปรียบเทียบอัตราการตายจากการจมน้ำระหว่างภาค พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการตายสูงสุด (6.3 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ ในขณะที่ กรุงเทพมหานคร มีอัตราการตายต่ำสุด (2.2 ต่อแสนประชากร) โดยมีแนวโน้มที่ลดลงจนถึงปี พ.ศ. 2558 แล้ว หลังจากนั้น บางภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2560-2561 ก่อนลดลงในปี 2562 (ภาพที่ 77)


ภาพที่ 77 แนวโน้มอัตรา
ตายจากการจมน้ำ ราย
ภาค ปี พ.ศ. 2553-2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูล
การตาย (มรณบัตร) และ
จำนวนประชากร (ตัวหาร)
จากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

เมื่อเปรียบเทียบตามเขตสุขภาพ จะพบว่าอัตราการตายจากการจมน้ำในปี พ.ศ. 2562 สูงสุดในเขต 10 (อุบลราชธานี) (6.8 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือ เขต 9 (นครราชสีมา) และเขต 8 (อุดรธานี) ในขณะที่เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) มีอัตราการตายต่ำสุด (2.2 ต่อแสนประชากร) (ภาพที่ 78) และหากเปรียบเทียบอัตราการตายระหว่าง จังหวัด พบว่า ตราด มีอัตราการตายสูงสุด รองลงมาคือ นครนายก ยโสธร และศรีสะเกษ ตามลำดับ (ภาพที่ 79)

ภาพที่ 78 อัตราตายจาก
การจมน้ำ รายเขต
สุขภาพ ปี พ.ศ. 2562



ที่มา: คำนวณจากฐานข้อมูล
การตาย (มรณบัตร) และ
จำนวนประชากร (ตัวหาร)
จากกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (จำแนกพื้นที่ตามที่อยู่ผู้ตาย)

ภาพที่ 79 แผนที่อัตราตายจากการจมน้ำ รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 และจังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุด 10 อันดับแรก

การจมน้ำตาย		
จังหวัด	เขตสุขภาพ	อัตราต่อแสนประชากร
ตราด	6	10.44
นครนายก	4	9.65
ยโสธร	10	8.74
ศรีสะเกษ	10	8.49
ชัยนาท	3	8.25
ปราจีนบุรี	6	8.13
สุรินทร์	9	7.88
บุรีรัมย์	9	7.72
มุกดาหาร	10	7.14
จันทบุรี	6	7.12

ที่มา: เหมือนภาพที่ 78

