

บทสรุป

จากการติดตาม 10 สถานการณ์สุขภาพ พบว่ามีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจนในหลายประเด็น หากพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2563 จะพบว่าในแต่ละภูมิภาคมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่สูงกว่าภาคอื่น โดยแต่ละภาคมีปัญหาสุขภาพ ที่มากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 เมื่อเทียบกับภาคอื่น ดังนี้

ภาคกลาง อันดับ 2 ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับ 1 ได้แก่ การจมน้ำตาย อันดับ 2 ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา อุบัติเหตุจราจร การฆ่าตัวตาย

ภาคเหนือ อันดับ 1 ได้แก่ มะเร็ง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การดื่มสุรา อุบัติเหตุจราจร การฆ่าตัวตาย อันดับ 2 ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจมน้ำตาย การถูกทำร้ายตาย

ภาคใต้ อันดับ 1 ได้แก่ การสูบบุหรี่ การถูกทำร้ายตาย

กรุงเทพมหานคร อันดับ 1 ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อันดับ 2 ได้แก่ มะเร็ง

ตารางที่ 2 ข้อมูล 10 สถานการณ์สุขภาพ จำแนกตามภาค ปี พ.ศ. 2563 (การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ปี พ.ศ. 2564)

ข้อมูล	ภาค					
	กลาง	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เหนือ	ใต้	กรุงเทพฯ	รวม
1. อัตราอุบัติเหตุร้ายแรงไข้หวัดใหญ่ (ต่อแสนประชากร)	170.03	167.94	276.41	85.62	396.56	189.75
2. อัตราอุบัติเหตุโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ต่อแสนประชากร)	55.24	50.90	74.75	42.61	89.20	58.27
3. อัตราตายโรคมะเร็งรวมทุกชนิด (ต่อแสนประชากร)	128.69	127.26	146.61	87.92	137.55	126.27
4. อัตราตายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4 โรค (ต่อแสนประชากร)	123.23	116.91	135.38	109.70	100.09	119.37
5. สัดส่วนการสูบบุหรี่ อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)	16.3	18.0	15.6	22.4	16.1	17.4
6. สัดส่วนการดื่มสุรา อายุ 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ)	26.8	32.3	33.1	16.7	27.2	28.0
7. อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจร (ข้อมูลมรณบัตร) (ต่อแสนประชากร)	28.01	28.02	30.74	23.07	10.14	26.28
8. อัตราตายจากการจมน้ำ (ต่อแสนประชากร)	4.23	6.29	4.76	4.08	2.12	4.81
9. อัตราตายจากการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร)	8.46	10.95	15.49	8.66	3.31	10.13
10. อัตราตายจากการถูกทำร้าย (ต่อแสนประชากร)	1.04	1.33	1.43	3.04	0.67	1.46

อันดับ 1
 อันดับ 2
 อันดับ 3
 อันดับ 4
 อันดับ 5